

LE VACCIN MODERNA CONTRE LA COVID-19

- Les fioles qui vous sont livrées sont DÉCONGELÉES;
- Vérifier si la fiole n'est pas expirée suite à sa décongélation (expiration inscrite sur le sac de livraison des fioles);
- Aucune reconstitution ne doit être faite.
- La fiole contient 10 doses.

STABILITÉ DU VACCIN			
	FIOLE DÉCONGELÉE NON PERFORÉE	FIOLE PERFORÉE	EN SERINGUE
Frigo	30 jours	6 heures	6 heures Administer sans délai le plus possible
Température pièce	12 heures	6 heures	6 heures Administer sans délai le plus possible

POUR PRÉPARER LA DOSE DU VACCIN MODERNA

- Si la fiole sort du réfrigérateur, la laisser reposer 15 minutes à la température de la pièce avant de prélever la première dose.
- Agiter doucement le flacon en lui faisant décrire des cercles à l'horizontale entre chaque prélèvement. **Ne pas secouer**;
- Pour préparer les doses individuelles, nettoyez le bouchon du flacon à l'aide d'un tampon antiseptique à usage unique en utilisant une technique aseptique. Laissez sécher le bouchon du flacon;
- Utilisez une aiguille de calibre 25 d'une longueur de 1-1 ½ po pour les adultes
- **Prélevez 0,5 mL** de vaccin dans une seringue *Luer Lock* stérile de 1 mL utilisée pour les injections intramusculaires. Si vous ne disposez pas d'une seringue *Luer Lock* de 1 mL, vous pouvez utiliser une seringue *Luer Lock* de 3 mL à graduation de 1/10 mL;
- Les manœuvres pour éliminer les bulles d'air doivent être effectuées lorsque l'aiguille est toujours dans le flacon afin d'éviter le gaspillage de vaccin;
- Il est recommandé d'utiliser la même aiguille pour prélever et administrer la dose chaque fois que cela est possible. Si une deuxième aiguille est nécessaire pour l'administration, tirez sur le piston de la seringue afin d'aspirer une petite quantité d'air dans la seringue avant de retirer la première aiguille afin d'éviter le gaspillage de la solution de vaccin pendant le changement d'aiguille;
- **Répétez les mêmes étapes pour les 9 autres doses contenues dans la fiole.**



POUR ADMINISTRER LA DOSE DU VACCIN MODERNA

- Avant l'administration, respectez les normes de soins et les techniques d'asepsie habituelles;
- Assurez-vous que la seringue préparée n'est pas froide au toucher;
- Faites un examen visuel pour vérifier que :
 - Le volume de la dose est bien de 0,5 mL;
 - Le contenu est dépourvu de particules étrangères autre que blanche ou translucide et n'a pas changé de couleur.
- Si l'inspection visuelle échoue (le volume de la dose n'est pas de 0,5 mL ou vous constatez la présence de particules et/ou un changement de couleur), **n'administrez pas le vaccin**;
- Le contenu des seringues préparées doit être administré immédiatement;
- Administrez le vaccin par voie intramusculaire selon la technique de soins en vigueur.

Références

- Monographie du produit.
- Webinaire donné par l'équipe de Moderna le 29 décembre 2020
- Protocole d'immunisation du Québec.