

## ORDONNANCE COLLECTIVE (CONDENSÉE)

Initier des mesures diagnostiques et une consultation  
pour des usagers présentant  
une hématurie macroscopique asymptomatique

### CLIENTÈLE VISÉE

- Usager adulte référé à l'Accueil clinique qui présente une hématurie macroscopique.

### INTENTION CLINIQUE

- Accélérer l'investigation en urologie pour l'usager présentant une condition clinique subaiguë.

### CONDITIONS D'INITIATION

- Être référé par un médecin d'une clinique participante.
- Avoir 18 ans et plus.
- Avoir une condition physique permettant les déplacements.
- Avoir eu un résultat de culture d'urine négative ayant été effectuée avant le début de l'antibiothérapie (s'il y a lieu).
- Présenter une hématurie macroscopique asymptomatique.

### CONTRE INDICATIONS à l'application de l'ordonnance collective

- Température buccale  $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$
- Grossesse
- Dysurie sévère
- Caillots dans les urines
- Douleur abdominale intense non-soulagée par analgésie
- Globe vésical
- Créatinine  $\geq 200 \mu\text{mol/l}$

EN VIGUEUR LE : 17 octobre 2013	N° : OC-121
DATE PRÉVUE DE RÉVISION : 17 octobre 2016	Page : 1 De : 1