

# FICHE INDICATIVE

Concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque

| Septembre 2017 |

POPULATIONS / CONDITIONS	GRIPPE <sup>1-2</sup> INDIQUÉ ET GRATUIT	PNEUMOCOQUE INDIQUÉ ET GRATUIT		
		PNEU-C <sup>3-4</sup> < 18 ANS	PNEU-C <sup>5</sup> ≥ 18 ANS	PNEU-P
<b>Femmes enceintes, en bonne santé au 2<sup>e</sup> ou au 3<sup>e</sup> trimestre de la grossesse (13 semaines et plus)</b>	Oui	Non <sup>5</sup>		
Personnes âgées de <b>2 à 64 ans, incluant les femmes enceintes (quel que soit le stade)</b> , présentant une des conditions énumérées ci-dessous :				
<b>Asplénie</b> anatomique ou fonctionnelle	Oui	Oui	Oui <sup>5</sup>	Oui <sup>7</sup>
Conditions amenant une <b>immunosuppression</b> (ex. : déficit immunitaire, leucémie, traitement immunosuppresseur, greffe d'organe ou de moelle osseuse, cancer, infection par le VIH)	Oui	Oui	Oui <sup>6</sup>	Oui <sup>7</sup>
<b>Maladie rénale chronique</b>	Oui	Oui	Non <sup>5</sup>	Oui <sup>7</sup>
<b>Maladie cardiaque</b> ou <b>pulmonaire chronique</b> assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers	Oui	Oui	Non <sup>5</sup>	Oui
<b>Asthme</b> assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, chez les personnes âgées de 50 ans et plus	Oui	Non <sup>5</sup>	Non <sup>5</sup>	Oui
<b>Asthme</b> assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, chez les personnes âgées de moins de 50 ans	Oui	Non <sup>5</sup>		
Conditions <b>entraînant une diminution de l'évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques d'aspiration</b> (ex. : trouble cognitif, lésion médullaire, trouble convulsif, troubles neuromusculaires)	Oui	Oui	Non <sup>5</sup>	Oui
<b>Diabète</b>	Oui	Oui	Non <sup>5</sup>	Oui
<b>Maladie hépatique chronique</b> (incluant cirrhose)	Oui	Oui	Non <sup>5</sup>	Oui
<b>Écoulement chronique de liquide céphalorachidien</b>	Non <sup>5</sup>	Oui	Non <sup>5</sup>	Oui
<b>Itinérance et/ou utilisation actuelle et régulière de drogues dures</b> (par inhalation ou injection) avec une <b>détérioration de l'état de santé</b> ou des <b>conditions de vie précaires</b>	Non <sup>5</sup>	Oui	Non <sup>5</sup>	Oui
Présence d'un <b>implant cochléaire</b>	Non <sup>5</sup>	Oui	Non <sup>5</sup>	Oui
<b>Anémie</b> (sauf si anémie falciforme – voir asplénie)	Oui	Non <sup>5</sup>		
<b>Hémophilie</b>	Oui	Non <sup>5</sup>		
<b>Erreur innée du métabolisme</b> (ex : tyrosinémie héréditaire de type I)	Oui	Non <sup>5</sup>		
<b>Obésité importante</b> (IMC ≥ 40)	Oui	Non <sup>5</sup>		
<b>Traitement prolongé à l'acide acétylsalicylique</b> (Pour les jeunes âgés de moins de 18 ans)	Oui	Non <sup>5</sup>		

CONDITIONS MÉDICALES OU CONDITIONS DE VIE

Cette fiche mentionne les indications de vaccination gratuite, soutenue financièrement par le MSSS, pour le vaccin contre la grippe à partir de l'âge de 6 mois, le vaccin contre le pneumocoque conjugué à partir de l'âge de 2 mois et le vaccin contre le pneumocoque polysaccharidique (23 valent) à partir de l'âge de 2 ans. Pour plus de détails, voir la section 9.8.1 « Autres vaccins recommandés » et le « Tableau synthèse sur l'utilisation recommandée des vaccins contre le pneumocoque » à la fin des sections 10.3.3 ou 10.3.4 du PIQ.

SOURCE : Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).

[msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination](http://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination)

# FICHE INDICATIVE

Concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque

POPULATIONS / CONDITIONS		GRIPPE <sup>1-2</sup> INDIQUÉ ET GRATUIT	PNEUMOCOQUE INDIQUÉ ET GRATUIT		
			PNEU-C <sup>3-4</sup> < 18 ANS	PNEU-C ≥ 18 ANS	PNEU-P
ÂGE OU MILIEU DE VIE	Résidents des centres d'accueil ou des établissements de longue durée	Oui	Non <sup>5</sup>		
	Enfants en bonne santé âgés de <b>6 à 23 mois</b>	Oui	Oui	-	Non
	Enfants âgés de <b>24 à 59 mois</b>	Non <sup>5</sup>	Oui	-	Non <sup>5</sup>
	Personnes âgées de <b>60 à 64 ans</b>	Oui	-	Non <sup>5</sup>	Non <sup>5</sup>
	Personnes âgées de <b>65 ans et plus</b>	Oui	-	Non <sup>5</sup>	Oui <sup>7</sup>
	Personnes vivant dans les communautés éloignées ou isolées	Oui	Oui	Non <sup>5</sup>	Non <sup>5</sup>
CONTACTS	Travailleurs de la santé, travailleurs en garderie et autres personnes qui, dans le cadre de leur travail ou de leurs activités, ont de nombreux contacts avec des personnes faisant partie des groupes à risque	Oui	Non <sup>5</sup>		
	Contacts domiciliaires des personnes faisant partie des groupes à risque, incluant l'entourage des enfants âgés de moins de 6 mois	Oui	Non <sup>5</sup>		

## LÉGENDE

- Chez les enfants âgés de 6 à 23 mois et chez les adultes, le vaccin injectable contre la grippe est le produit recommandé. Chez les enfants âgés de 2 à 17 ans, le vaccin intranasal ou le vaccin injectable peuvent être utilisés.
- Chez les enfants âgés de moins de 9 ans qui n'ont jamais reçu de vaccin contre la grippe, administrer 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Toutefois la seconde dose n'est pas requise si un enfant a reçu au moins 1 dose d'un vaccin trivalent ou quadrivalent dans le passé.
- Le vaccin conjugué contre le pneumocoque (Pneu-C) fait partie du calendrier régulier de vaccination chez les enfants âgés de 2 mois à 4 ans. Le nombre de doses à administrer varie en fonction de l'âge de début de la vaccination et des conditions de santé de l'enfant.
- Les jeunes âgés de moins de 18 ans à risque accru d'infection invasive à pneumocoque qui n'ont jamais reçu le vaccin conjugué Pneu-C-13 doivent recevoir au moins 1 dose de ce vaccin. Le vaccin conjugué doit être administré en premier, au moins 8 semaines avant le vaccin polysaccharidique (Pneu-P). Sinon, attendre 1 an avant d'administrer le vaccin conjugué.
- À moins de présenter une des autres conditions mentionnées dans cette fiche pour lesquelles le vaccin gratuit est indiqué.
- Les adultes présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un état d'immunosuppression qui n'ont jamais reçu le vaccin conjugué Pneu-C-13 doivent recevoir 1 dose de ce vaccin. Le vaccin conjugué doit être administré en premier, au moins 8 semaines avant le vaccin polysaccharidique (Pneu-P). Sinon, attendre 1 an avant d'administrer le vaccin conjugué.
- La revaccination contre les infections invasives à pneumocoque avec le Pneu-P est recommandée chez les personnes présentant une asplénie, un état d'immunosuppression, une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique. On revaccine ces personnes avec le Pneu-P 5 ans après la 1<sup>re</sup> dose du vaccin polysaccharidique.  
Les personnes ayant reçu le vaccin avant l'âge de 65 ans doivent également recevoir une dose de Pneu-P à partir de l'âge de 65 ans, au moins 5 ans après la dernière dose, peu importe le nombre de doses reçues dans le passé.  
L'utilité de toute dose subséquente reste à préciser.

