

GUIDE - TESTS DE DÉPISTAGE



QUAND UTILISER UN TEST RAPIDE ?

✓ Lorsque vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19



Fièvre



Toux ou
mal de gorge



Perte du goût
ou de l'odorat

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT

Si le résultat est **POSITIF**



Isolez-vous

ET

prenez un test de dépistage
dans un centre de dépistage

Si le résultat est **NÉGATIF**



Isolez-vous

ET

prenez un 2^e test rapide
24 heures plus tard

Si le résultat est **POSITIF**



Isolez-vous

ET

prenez un test de dépistage
dans un centre de dépistage

Si le résultat est **NÉGATIF**

Et que vos symptômes
diminuent :
prenez vos activités
tout en respectant les
consignes sanitaires

Et que vos symptômes
perduent ou s'aggravent :
utilisez l'outil
d'autoévaluation ou
consultez un professionnel
de la santé au besoin

Que faire si vous n'avez pas de tests rapides à la maison ?

Si vous avez des symptômes, rendez-vous dans un centre de dépistage. Si vous n'avez pas de symptômes, il est inutile de vous rendre dans un centre de dépistage. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19, isolez-vous et observez vos symptômes. Si des symptômes apparaissent, allez vous faire dépister.

Plus d'information au
[Québec.ca/testCOVID-19](https://quebec.ca/testCOVID-19)