

Il est recommandé de laisser le bracelet d'identification de l'hôpital à la dépouille.

Gestion de la dépouille à la chambre	
1. Porter l'équipement de protection individuelle requis en tout temps dans la chambre.	<input type="checkbox"/>
2. Placer l'usager dans le linceul.	<input type="checkbox"/>
3. Désinfecter l'extérieur du linceul avec le désinfectant usuel avant de sortir la dépouille de la chambre.	<input type="checkbox"/>
4. Indiquer clairement, sur le linceul, que la dépouille est COVID-19 positive.	<input type="checkbox"/>
5. Retirer gants, blouse, protection oculaire avant de sortir de la chambre (hygiène des mains à faire après chaque étape).	<input type="checkbox"/>
6. Retirer le masque. <i>Au besoin référez-vous à la procédure « Revêtir et retirer l'équipement de protection individuelle ».</i>	<input type="checkbox"/>
7. Procéder à l'hygiène des mains.	<input type="checkbox"/>
8. Appliquer les procédures régulières de l'établissement pour le transport de la dépouille.	<input type="checkbox"/>
Autopsie	
<ul style="list-style-type: none"><li>Si une autopsie est nécessaire, procéder dans une pièce à pression négative et appliquer les précautions additionnelles <b>AÉRIENNES-CONTACT+</b> avec protection oculaire.</li></ul>	<input type="checkbox"/>

Service de prévention et contrôle des infections