


## Aide à la décision sur le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 à administrer aux personnes ayant déjà eu la maladie



1. Si le cas de COVID-19 a été identifié par un lien épidémiologique avec un cas confirmé par laboratoire, considérer la personne comme n'ayant pas eu la maladie.
2. Pour confirmer que la personne a eu la COVID-19, poser la question : Avez-vous déjà eu un résultat de test prouvant que vous aviez la COVID-19?
3. Si la personne a eu la COVID-19 dans les trois derniers mois, elle peut prendre un autre rendez-vous pour respecter un intervalle de trois mois tel que recommandé ou, si elle le préfère, être vaccinée aujourd'hui.
4. Une seule dose du vaccin est recommandée aux personnes qui ont eu la COVID-19 21 jours ou plus avant la première dose parce que la maladie a amorcé la réponse du système immunitaire comme le fait une première dose de vaccin et la dose donnée aujourd'hui fera un effet de rappel comme le fait une deuxième dose de vaccin.
5. Il n'y a pas de danger à administrer deux doses de vaccin à quelqu'un qui a eu la COVID-19, mais le risque d'avoir des réactions indésirables est plus élevé.
6. Pour les personnes immunodéprimées, administrer deux doses au total.
7. Pour les personnes dont la dose de vaccin contre la COVID-19 a été reçue moins de 21 jours après le début des symptômes de la COVID-19, administrer deux doses au total. Pour connaître l'intervalle recommandé pour administrer cette deuxième dose, consultez le [PIQ](#).