

# INFORMATION SUR LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 DISTRIBUÉS AU QUÉBEC 2020-2021

	PB COVID-19 (Pfizer/BioNTech)	MOD COVID-19 (Moderna)	AZ COVID-19 (AstraZeneca) ou COVISHIELD (Serum Institute of India)
<b>Type de vaccin</b>	Vaccin à ARN messenger	Vaccin à ARN messenger	Vaccin à vecteur viral non réplicatif (adénovirus simien)
<b>Posologie et voie d'administration</b>	0,3 ml X 2 doses IM	0,5 ml X 2 doses IM	0,5 ml x 2 doses IM
<b>Âge autorisé</b>	12 ans et plus	18 ans et plus	18 ans et plus
<b>Clientèle visée par la campagne de vaccination</b>	Personnes âgées de 12 ans et plus	Personnes âgées de 18 ans et plus	Personnes âgées de 18 ans et plus qui ont une contre-indication aux vaccins à ARN messenger Personnes âgées de 45 et plus immunocompétentes ayant reçu une 1 <sup>re</sup> dose de ce vaccin et qui ne souhaitent pas recevoir de vaccin à ARN messenger comme 2 <sup>e</sup> dose*
<b>Contre-Indications</b>	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin, notamment le polyéthylène glycol (PEG)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin, notamment le polyéthylène glycol (PEG) et la trométhamine	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin, notamment le Polysorbate 80 Antécédent d'allergie immédiate après l'administration d'un vaccin contenant du Polysorbate Antécédent de thrombose avec thrombocytopénie immunitaire Antécédent de thrombocytopénie induite par l'héparine <b>Antécédent de syndrome de fuite capillaire</b>
<b>Précautions **</b>	Antécédents de réaction allergie immédiate après l'administration d'un vaccin contenant du Polysorbate ou de réaction allergique immédiate légère ou modérée (non anaphylactique) à la suite d'une dose antérieure <b>Antécédent de myocardite ou péricardite à la suite d'une dose antérieure d'un vaccin à ARN messenger</b>	Antécédents de réaction allergie immédiate après l'administration d'un vaccin contenant du Polysorbate ou de réaction allergique immédiate légère ou modérée (non anaphylactique) à la suite d'une dose antérieure <b>Antécédent de myocardite ou péricardite à la suite d'une dose antérieure d'un vaccin à ARN messenger</b>	Antécédents de réaction allergique au PEG ou de réaction allergique immédiate légère ou modérée (non anaphylactique) à la suite d'une dose antérieure
<b>Présentation</b>	FiOLE multidose de 2 ml (6 doses) Diluant de 10 ml de NaCl 0.9% sans agent de conservation	FiOLE multidose de 5 ml (10 doses) <b>FiOLE multidose de 8 ml (14 doses)</b>	FiOLE multidose de 5 ml (10 doses)
<b>Diluant</b>	Oui	Non	Non
<b>Adjuvant</b>	Aucun	Aucun	Aucun
<b>Trace d'antibiotique</b>	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
<b>Agent de conservation</b>	Aucun	Aucun	Aucun
<b>Composition***</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 µg d'ARN messenger</li> <li>• lipides : ALC-0315 = bis(2-hexyldécanoate)de ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyle), ALC-0159 = 2-[(polyéthylène glycol)-2000]-N,N-ditétracyclacétamide, 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine et cholestérol;</li> <li>• chlorure de potassium, phosphate dibasique de sodium dihydraté, chlorure de sodium, phosphate monobasique de potassium et saccharose;</li> <li>• diluant composé d'eau stérile et chlorure de sodium.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 µg d'ARN messenger</li> <li>• lipides : 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, SM-102, polyéthylène glycol-2000 DMG (1,2-dimyristoyl-rac-glycérol, méthoxy-polyéthylène glycol) et cholestérol;</li> <li>• trométhamine, chlorhydrate de trométhamine, acide acétique et saccharose;</li> <li>• eau pour injection.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x 10<sup>10</sup> de particules virales à adénovirus simien</li> <li>• chlorhydrate de L-histidine monohydraté</li> <li>• chlorure de magnésium hexahydraté;</li> <li>• chlorure de sodium;</li> <li>• édétate (EDTA) disodique dihydraté;</li> <li>• éthanol;</li> <li>• L-Histidine;</li> <li>• Polysorbate 80;</li> <li>• saccharose;</li> <li>• eau pour injection.</li> </ul>
<b>Latex naturel</b>	Absence	Absence	Absence

\* Le CIQ recommande de ne plus administrer le vaccin AZ COVID-19 ou Covishield et privilégie l'administration des vaccins à ARNm.

\*\*Des précautions s'appliquent pour la femme enceinte, celle qui allaite, la personne immunodéprimée ou la personne ayant une maladie auto-immune. Voir la section Précautions de la section COVID-19 concernée dans le [Protocole d'immunisation du Québec \(PIQ\)](#).

\*\*\* Pour savoir quels vaccins contiennent des composants semblables aux vaccins COVID-19, consultez : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation/page-15-contenu-agents-immunisants-utilises-canada.html#p1c14t1>.

Le [PIQ](#) demeure l'outil de référence en matière de vaccination et doit être consulté pour de plus amples détails.

13 juillet 2021