

Protocole de traitement d'anaphylaxie suite à la vaccination

Annexe 1/Clinique de vaccination

MESURES D'URGENCES

- 1 Procéder à l'évaluation de l'usager. Identifier la présence de signes et symptômes de réaction anaphylaxie tels qu'une difficulté respiratoire sévère, un pouls rapide, faible et irrégulier, des douleurs abdominales, etc.
- 2 Sans tarder, administrer par voie intramusculaire (IM) 0,01 ml/kg (maximum 0,5 ml) d'adrénaline 1 : 1 000, dans un autre site que celui ou ceux où les vaccins ont été administrés ou à 2,5 cm du point d'injection d'un vaccin (muscle de la cuisse de préférence). Cette dose peut être répétée à un autre site d'injection, toutes les 5 à 15 minutes selon l'état clinique, s'il n'y a pas d'amélioration des signes vitaux pour un maximum de 3 fois.
- 3 Demander de l'aide et lancer le code bleu par téléphone au « **55555** » et mentionner comme lieu annexe 1/Clinique de vaccination. Suite à l'annonce du code bleu, le répartiteur au poste de sécurité communiquera avec le 911.
- 4 Coucher la personne sur le dos les jambes surélevées.
- 5 Surveiller les signes vitaux (tension artérielle, pouls, respiration) et commencer la réanimation cardiorespiratoire au besoin. L'équipe de réanimation arrivera dans les plus brefs délais. Documenter les informations sur le formulaire « Feuille de réanimation cardiorespiratoire ».
- 6 Lors de l'arrivée des ambulanciers, ceux-ci transféreront la personne le plus rapidement possible à l'urgence.
- 7 Documenter les informations sur la réaction anaphylactique en lien avec la vaccination.
- 8 Remplir le formulaire de déclaration d'une manifestation clinique grave ou inhabituelle après vaccination (MCI).

ADMINISTRATION ADRÉNALINE 1 : 1 000

ÂGE	POSOLOGIE	VOIE D'ADMINISTRATION	SITE D'INJECTION PRIVILÉGIÉ
Entre 2 et 6 mois	0,07 mL	IM	Muscle de la cuisse (face antéro-latérale) Voir annexe 2
Entre 7 et 17 mois	0,1 mL		
Entre 18 mois et 4 ans	0,15 mL		
5 ans	0,2 mL		
Entre 6 et 9 ans	0,3 mL		
Entre 10 et 13 ans	0,4 mL		
≥14 ans	0,5 mL		