

Fiche de signalement de surdose

Transmettre à la Direction de santé publique du CISSS de Laval par **télécopieur au 450 978-2118 (confidentiel)**
ou par courriel à surdoselaval.cisslav@ssss.gouv.qc.ca

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT	NATURE DU SIGNALEMENT
Nom : _____ Téléphone : _____ Direction / Service : _____ Date d'obtention des informations : _____	<input type="checkbox"/> Surdose sévère (ex. administration de naloxone, intubation, soins intensifs, hospitalisation, décès, etc.) <input type="checkbox"/> Effets inhabituels (ex. somnolence après consommation de stimulants) <input type="checkbox"/> Évènement inhabituel (ex. agrégat de surdoses, milieu festif, nouvelle substance)

IDENTIFICATION DE LA VICTIME DE LA SURDOSE (UNE FICHE PAR PERSONNE)
Nom : _____ Prénom : _____ DDN : _____ Sexe : <input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Autre RAMQ : _____ Informations obtenues auprès de : <input type="checkbox"/> Victime de la surdose <input type="checkbox"/> Témoin de la surdose <input type="checkbox"/> Autre : _____

DESCRIPTION DE L'ÉVÈNEMENT
Date : _____ Heure : _____ Quartier : _____ Lieu : <input type="checkbox"/> Résidence privée <input type="checkbox"/> Lieu public intérieur <input type="checkbox"/> Lieu public extérieur <input type="checkbox"/> Lieu dédié à la consommation <input type="checkbox"/> Autre : _____ Combien de personnes ont consommé cette(ces) substance(s) en même temps? : _____ Combien de ces personnes ont fait une surdose? : _____ *Compléter une fiche par personne

DESCRIPTION DES SUBSTANCES CONSOMMÉES			
Substance(s) et forme (ex. cocaïne en poudre)	Mode de consommation (fumé/prisé/injecté/oral/autre)	Quartier d'achat	Substance disponible pour analyse (O/N)

INFORMATIONS CLINIQUES
Symptômes à l'arrivée : <input type="checkbox"/> Détresse respiratoire <input type="checkbox"/> Myosis (pupilles contractées) <input type="checkbox"/> Lèvres bleues <input type="checkbox"/> Sudation excessive <input type="checkbox"/> Hyperthermie <input type="checkbox"/> Palpitations cardiaques <input type="checkbox"/> Autres : _____
Administration de naloxone avant l'arrivée à l'hôpital : <input type="checkbox"/> Par Urgence-santé <input type="checkbox"/> Par un proche <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sais pas
Administration de naloxone à l'hôpital : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Commentaires : _____
Prélèvement envoyé au CTQ pour analyse toxicologique à des fins de vigie (voir procédure à la 2^e page) : <input type="checkbox"/> Sanguin (1 ^{er} choix) <input type="checkbox"/> Urine
Trousse de naloxone remise au patient : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Commentaires : _____
État actuel : <input type="checkbox"/> Congé <input type="checkbox"/> Observation <input type="checkbox"/> Soins intensifs <input type="checkbox"/> Refus de traitement <input type="checkbox"/> Décès

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez rappeler à la victime de surdose qu'elle peut contribuer à faire retirer du marché la drogue contaminée en appelant la **ligne INFO de la police de Laval au n° suivant : 450-662-INFO (4636) ou en allant sur le site web www.infocrimemontreal.ca**. Elle pourra ainsi transmettre l'information de manière **anonyme et confidentielle**.

Pour toute information supplémentaire ou en cas de situation clinique inhabituelle, vous pouvez communiquer avec la Direction de santé publique du CISSS de Laval au 450-978-2121, poste : 32117 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h à 16h30) et demander à parler au répondant surdose de garde.

En dehors des heures ouvrables, vous pouvez communiquer avec le médecin de garde en maladies infectieuses via la téléphoniste de l'hôpital Cité-de-la-santé au 450 668-1010.

Prélèvement d'échantillon lors de surdoses de drogues pour analyse toxicologique au Centre de toxicologie du Québec (CTQ)

En situation de surdose sévère, d'effets inhabituels liés à la consommation ou de tout évènement inhabituel, prélever un échantillon de sang et/ou urine et l'envoyer au CTQ pour analyse toxicologique. Le rapport de toxicologie parviendra au Directeur de santé publique après quelques semaines et contribuera à la vigie. Des appels à la vigilance peuvent résulter de cette vigie afin que les consommateurs soient informés des risques.

Si le clinicien a besoin d'un test qualitatif détectant le fentanyl en urgence pour soigner son patient, celui-ci doit appeler au Centre antipoison du Québec (1-800-463-5060). Ce dernier organisera l'envoi d'un prélèvement spécifique vers le laboratoire du CHU Ste-Justine. Prévoir tout de même un prélèvement distinct à envoyer au CTQ.

Procédure d'envoi du prélèvement au CTQ

À l'intention des cliniciens:

Sang (à prioriser, si consommation il y a <24h) :

- Analyse à demander : **Dépistage LC-MSMS**
- Indiquer sur la requête « **Enquête surdose Laval** »
- Tube lavande (EDTA)
- Inverser immédiatement le tube de sang pour un total de 8 à 10 fois afin de bien mélanger l'anticoagulant
- Quantité minimale requise : 2 ml

Urine (à faire avec prélèvement sanguin en tout temps, à prioriser si consommation >24h) :

- Analyse à demander : **Dépistage LC-MSMS**
- Indiquer sur la requête « **Enquête surdose Laval** »
- Prélèvement : pot de culture d'urine en plastique sans préservatif
- Réfrigérer le spécimen à 4 degrés
- Quantité minimale requise : 2 ml

Important : Toutes les informations doivent être inscrites sur la requête afin que le spécimen ne soit pas rejeté

À l'intention du laboratoire de l'hôpital Cité-de-la-santé de Laval:

Sang :

- Analyse demandée : **Dépistage LC-MSMS**
- S'assurer d'indiquer sur la requête « **Enquête surdose Laval** »
- Tube lavande (EDTA)
- Centrifuger le prélèvement et décanter le plasma dans un tube polypropylène
- S'il vous plaît, veuillez privilégier les expéditions groupées en début de semaine
- Réfrigérer le spécimen à 4 degrés pour un maximum de 30 jours

Urine :

- Analyse demandée : **Dépistage LC-MSMS**
- S'assurer d'indiquer sur la requête « **Enquête surdose Laval** »
- Prélèvement : pot de culture d'urine en plastique sans préservatif
- Réfrigérer le spécimen à 4 degrés pour un maximum de 30 jours

Adresse d'expédition :

Centre de toxicologie du Québec
Direction de santé environnementale et toxicologique
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, 4^e étage
Québec (Québec) G1V 5B3