

## **CONTRE-INDICATIONS AU MIFE-MISO**

- Grossesse extra-utérine
- Insuffisance surrénalienne
- Troubles de la coagulation et hémorragiques et anticoagulants
- Asthme non contrôlé (crise récente < 30 jrs
- Hypersensibilité connue à la mifépristone, au miso prostol, à d'autres prostaglandines ou à l'un des excipients du mifégymiso
- Stérilet en place ne pouvant être retiré
- Corticothérapie en systémique prolongée
- Porphyrie congénitale
- Hémoglobine < 95

## **TRAITEMENT AU MIFE-MISO À ÉVITER**

- Femmes qui allaitent
- Vomissements de grossesse (cliente déshydratée)
- Troubles rénaux ou hépatiques

mars 2018

## **CONTRE-INDICATIONS AU MIFE-MISO**

- Grossesse extra-utérine
- Insuffisance surrénalienne
- Troubles de la coagulation et hémorragiques et anticoagulants
- Asthme non contrôlé (crise récente < 30 jrs
- Hypersensibilité connue à la mifépristone, au miso prostol, à d'autres prostaglandines ou à l'un des excipients du mifégymiso
- Stérilet en place ne pouvant être retiré
- Corticothérapie en systémique prolongée
- Porphyrie congénitale
- Hémoglobine < 95

## **TRAITEMENT AU MIFE-MISO À ÉVITER**

- Femmes qui allaitent
- Vomissements de grossesse (cliente déshydratée)
- Troubles rénaux ou hépatiques

mars 2018