

# Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021

## Principaux résultats portant sur la population lavalloise âgée de 15 ans et plus

L'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) est réalisée tous les six ans par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Cette enquête à portée provinciale, régionale et locale est menée auprès des personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un logement non institutionnel au Québec. Pour l'EQSP 2020-2021, 1 754 Lavallois ont participé à l'enquête. Le taux de réponse est de 62,1 % (63,7 % pour l'ensemble du Québec).

L'EQSP vise à recueillir des renseignements sur les habitudes de vie, l'état de santé physique et mentale ainsi que certains déterminants de la santé de la population. Avec l'apparition de la COVID-19, des questions ont été ajoutées à cette édition afin de déterminer certains impacts de la pandémie. Au total, 104 indicateurs ont été utilisés dans cette enquête, s'ajoutent à cela des centaines de sous-indicateurs.

Pour une première fois, Laval a accès à des données provenant de l'EQSP par secteurs d'aménagement. À noter que ces données seront intégrées dans de prochaines publications.

Dans le présent document, quelques indicateurs intéressants sont présentés illustrant les proportions brutes de Laval et de l'ensemble du Québec pour les trois cycles d'enquête, soit 2008, 2014-2015 et 2020-2021. De plus, les tests statistiques sont effectués entre les proportions ajustées de Laval versus le reste du Québec pour les deux dernières éditions.

## RÉSULTATS LAVALLOIS : QUELQUES FAITS SAILLANTS

- En 2020-2021, la proportion de la population lavalloise âgée de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale a doublé comparativement à 2014-2015 (passant de 6,9 % à 14,9 %).
- La proportion de la population lavalloise ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois a diminué significativement, puisqu'elle s'établissait à 17,5 % en 2014-2015 et à 13,7 % en 2020-2021. Toutefois, Laval affiche une proportion plus faible que dans le reste du Québec.
- La proportion de la population lavalloise âgée de 18 ans et plus présentant un poids normal a diminué significativement, passant de 40,4 % en 2014-2015 à 36,0 % en 2020-2021. Quant aux proportions présentant de l'obésité et un surplus de poids (embonpoint ou obésité), elles ont connu des hausses importantes (respectivement de 20,1 % à 24,0 % et de 57,8 % à 61,7 %). En outre, la proportion de la population lavalloise adulte présentant un surplus de poids se révèle plus élevée que dans le reste du Québec.
- À Laval, la proportion de fumeurs actuels (quotidiens ou occasionnels) de cigarettes est de 15,1 % en 2020-2021. Bien que les données lavalloises ne permettent pas de confirmer un écart statistiquement significatif entre les deux derniers cycles d'enquête, elles semblent suivre la même tendance observée dans l'ensemble du Québec. En effet, les données québécoises permettent de confirmer une tendance à la baisse, ayant passé de 19,4 % (donnée non présentée) à 15,4 % entre 2014-2015 et 2020-2021.
- La proportion des Lavallois âgés de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois a augmenté. Elle était respectivement de 12,3 % en 2014-2015 et de 13,5 % en 2020-2021. Toutefois, la proportion à Laval demeure plus faible que dans le reste du Québec.
- La part de la population lavalloise ayant déjà fait usage de drogues par injection a connu une diminution significative, passant de 0,8 % à 0,3 % entre 2014-2015 et 2020-2021. La proportion à Laval demeure plus faible que dans le reste du Québec.
- La proportion de la population lavalloise active sexuellement au cours des 12 derniers mois n'ayant jamais utilisé le condom est de 64,3 %, une proportion plus faible que dans le reste du Québec.
- On observe une augmentation significative de la proportion de la population lavalloise âgée de 15 ans et plus se situant à un niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique, passant de 31,5 % à 40,4 % entre 2014-2015 et 2020-2021.
- On constate une diminution significative de la proportion de la population lavalloise âgée de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre, s'établissant à 14,4 % en 2014-2015 et à 11,5 % en 2020-2021.
- La proportion de la population lavalloise âgée de 15 ans et plus ayant déjà vécu un épisode d'itinérance est de 2,6 %. Cette proportion se révèle statistiquement plus faible que dans le reste du Québec.

- La proportion des Lavallois âgés de 15 ans et plus ayant songé sérieusement au suicide au cours de leur vie est à 11,4 % en 2020-2021. En outre, cette proportion s'avère plus faible que dans le reste du Québec.
- La proportion des travailleurs lavallois ayant eu des troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois a augmenté significativement, allant de 36,8 % en 2014-2015 à 43,6 % en 2020-2021.
- On observe une forte diminution de la proportion des travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique ou sexuel au moins une fois au travail. Elle passe de 21,2 % en 2014-2015 à 11,5 % en 2020-2021.
- La proportion des travailleurs salariés exposés à un niveau faible ou modéré de soutien au travail de la part des collègues a connu une diminution significative entre 2014-2015 et 2020-2021, respectivement 21,4 % et 16,8 %.

## Principaux indicateurs sur la **perception de l'état de santé et la santé buccodentaire**

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Perception de l'état de santé et de la vie sociale</b>					
Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé	9,6	9,8	10,0	=	10,8
Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire	11,2	13,3	14,9	=	13,5
Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale	7,0	6,9	14,9	↑	14,7
<b>Santé buccodentaire</b>					
Proportion de la population n'ayant aucune dent naturelle	8,5	7,8	7,0	=	8,3
Proportion de la population ayant visité le dentiste ou un autre professionnel des soins dentaires il y a moins d'un an	N/D	N/D	58,2	N/D	56,7

↑/↓ : Augmentation ou diminution de la proportion statistiquement significative entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

N/D : Résultat non disponible.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

## Principaux indicateurs sur la **santé respiratoire et sur les blessures accidentelles**

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Santé respiratoire</b>					
Proportion de la population ayant eu des symptômes de rhinite allergique <sup>1</sup> au cours des 12 derniers mois	N/C	17,5	13,7 (-)	↓	15,4
Proportion de la population ayant déjà reçu un diagnostic de rhinite allergique	15,3	15,3	15,1	=	16,0
<b>Blessures accidentelles</b>					
Proportion de la population victime de blessure non intentionnelle <sup>2</sup> au cours des 12 derniers mois	11,0	10,3	11,2	=	11,6
Proportion de la population de 65 ans et plus victime de blessure non intentionnelle causée par une chute au cours des 12 derniers mois	N/D	** 2,5	* 4,3	=	4,6

(+, -) : Proportion lavalloise de 2020-2021 statistiquement plus élevée ou plus faible que de celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5 %.

↑/↓ : Augmentation ou diminution de la proportion statistiquement significative entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

N/D : Résultat non disponible.

N/C : Résultat non comparable entre les cycles.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

<sup>1</sup> Les symptômes sont les suivants : éternuements, nez qui coule ou nez bouché sans avoir de rhume ou de grippe, larmoiements et démangeaisons des yeux.

<sup>2</sup> Cela implique des blessures assez graves pour limiter les activités normales au cours des 12 derniers mois, sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs, par exemple, une fracture, une coupure profonde, une brûlure grave, une entorse ou un empoisonnement.

## Principaux indicateurs sur le statut pondéral, la perception corporelle et les actions à l'égard du poids

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Statut pondéral, perception corporelle et actions à l'égard du poids</b>					
Proportion de la population de 18 ans et plus présentant un poids insuffisant <sup>3</sup>	* 2,1	* 1,8	* 2,3	=	2,3
Proportion de la population de 18 ans et plus présentant un poids normal	43,0	40,4	36,0	↓	38,4
Proportion de la population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint	37,7	37,8	37,8	=	36,0
Proportion de la population de 18 ans et plus présentant de l'obésité	17,2	20,1	24,0	↑	23,3
Proportion de la population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids (embonpoint ou obésité)	55,0	57,8	61,7 (+)	↑	59,3
Proportion de la population se percevant trop maigre	* 3,3	3,2	3,3	=	3,0
Proportion de la population percevant son poids comme étant normal	57,9	57,2	52,2	↓	55,1
Proportion de la population se percevant avec un excès de poids	38,7	39,6	44,5	↑	41,9
Proportion de la population ayant tenté de perdre du poids au cours des six derniers mois	19,8	24,9	28,0 (+)	=	23,6

(+, -) : Proportion lavalloise de 2020-2021 statistiquement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5 %.

↑/↓ : Augmentation ou diminution de la proportion statistiquement significative entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

<sup>3</sup> L'indice de masse corporelle (IMC) a été calculé pour obtenir les catégories de la répartition de la population de 18 ans et plus selon le statut pondéral. Les catégories de cet indicateur sont : poids insuffisant (IMC inférieur à 18,5 kg/m<sup>2</sup>); poids normal (IMC égal ou supérieur à 18,5 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 25 kg/m<sup>2</sup>); embonpoint (IMC égal ou supérieur à 25,0 kg/m<sup>2</sup> et inférieur 30,0 kg/m<sup>2</sup>); obésité (IMC égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup>).

## Principaux indicateurs sur l'activité physique et les habitudes alimentaires

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Activité physique</b>					
Proportion de la population considérée comme étant active <sup>4</sup> dans leurs activités physiques de loisir et de transport au cours des quatre dernières semaines	N/D	35,9	30,2 (-)	=	34,3
Proportion de la population considérée comme étant moyennement active dans leurs activités physiques de loisirs et de transport au cours des quatre dernières semaines	N/D	10,4	9,1 (-)	=	11,1
Proportion de la population considérée comme étant un peu active dans leurs activités physiques de loisirs et de transport au cours des quatre dernières semaines	N/D	18,8	16,8	=	17,5
Proportion de la population considérée comme étant sédentaire dans leurs activités physiques de loisirs et de transport au cours des quatre dernières semaines	N/D	35,0	44,0 (+)	=	37,1
<b>Boissons sucrées</b>					
Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus	N/D	N/D	49,7	N/D	51,9

(+, -) : Proportion lavalloise de 2020-2021 statistiquement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

N/D : Résultat non disponible.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

<sup>4</sup> Les niveaux d'activité physique sont déterminés à partir de l'indicateur Nolin.

## Principaux indicateurs sur le **tabagisme**

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Tabagisme</b>					
Proportion de fumeurs actuels <sup>5</sup> de cigarettes	21,2	18,0	15,1	=	15,4
Proportion de fumeurs quotidiens	N/D	11,9	9,6	=	10,3
Proportion de fumeurs occasionnels <sup>6</sup>	N/D	6,1	5,5	=	5,2
Proportion d'anciens fumeurs <sup>7</sup>	N/D	27,0	26,0 (-)	=	29,4
Proportion de non-fumeurs <sup>8</sup>	N/D	55,0	58,8 (+)	=	55,1
Proportion de la population ayant utilisé la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours	N/D	N/D	5,7	N/D	5,6

(+, -) : Proportion lavalloise de 2020-2021 statistiquement plus élevée ou plus faible que de celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

N/D : Résultat non disponible.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

<sup>5</sup> Cela inclut les statuts de fumeurs quotidiens et occasionnels.

<sup>6</sup> Ce sont les personnes qui fument actuellement, mais sans fumer tous les jours.

<sup>7</sup> Ce sont les personnes qui ont fait l'expérience d'au moins une cigarette au cours de leur vie.

<sup>8</sup> Ce sont les personnes qui n'ont jamais fumé une cigarette complète.



## Principaux indicateurs sur la consommation d'alcool et de drogues

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Consommation d'alcool et de drogues</b>					
Proportion de la population ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois	N/D	N/D	73,1 (-)	N/D	79,3
Proportion de la population présentant une consommation excessive <sup>9</sup> d'alcool une fois par mois ou plus au cours des 12 derniers mois	N/D	N/D	15,8 (-)	N/D	23,6
Proportion de consommateurs de drogues <sup>10</sup> au cours des 12 derniers mois	10,1	13,5	14,5 (-)	=	19,2
Proportion de la population ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours des 12 derniers mois	9,5	12,3	13,5 (-)	↑	17,6
Proportion de la population s'étant procuré du cannabis auprès de la Société québécoise du cannabis (SQDC) en ligne ou en boutique parmi celle ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	N/D	N/D	59,5	N/D	67,7
Proportion de la population ayant pris place dans un véhicule motorisé conduit par une personne qui avait consommé du cannabis dans les deux heures précédant la conduite au cours des 12 derniers mois	N/D	N/D	* 1,5 (-)	N/D	2,7
Proportion de la population ayant déjà fait usage de drogues par injection	** 0,3	** 0,8	** 0,3 (-)	↓	0,7
Proportion de la population ayant consommé des médicaments prescrits contenant des opioïdes au cours des 12 derniers mois	N/D	N/D	11,6	N/D	12,9

(+, -) : Proportion lavalloise de 2020-2021 statistiquement plus élevée ou plus faible que de celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5 %.

↑/↓ : Augmentation ou diminution de la proportion statistiquement significative entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

N/D : Résultat non disponible.

**Source :** Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

<sup>9</sup> Cela signifie de boire 4 (pour une répondante dont le sexe à la naissance est féminin) à 5 verres (pour un répondant dont le sexe à la naissance est masculin) ou plus d'alcool à une même occasion au cours des 12 derniers mois.

<sup>10</sup> Une personne ayant pris ou essayé de la marijuana, du cannabis, du pot ou du haschich, de la cocaïne ou du crack (coke, *free base*, poudre), etc.

## Principaux indicateurs sur les comportements liés à la sexualité et infections transmises sexuellement

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Comportements liés à la sexualité et infections transmises sexuellement</b>					
Proportion de la population active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant toujours utilisé le condom	15,8	15,3	14,3	=	11,9
Proportion de la population active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant utilisé à l'occasion le condom	13,6	22,1	21,4 (+)	=	18,4
Proportion de la population active sexuellement au cours des 12 derniers mois n'ayant jamais utilisé le condom	70,5	62,6	64,3 (-)	=	69,7
Proportion des femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif	62,8	85,1	84,3	=	83,7
Proportion des hommes actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif	48,0	72,4	66,3	=	69,6
Proportion de la population ayant déjà eu des relations sexuelles qui a eu un diagnostic d'infection transmise sexuellement	6,5	8,7	9,0	=	9,9

(+, -) : Proportion lavalloise de 2020-2021 statistiquement plus élevée ou plus faible que de celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5 %.  
 = : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

## Principaux indicateurs sur la **santé mentale et sur la défavorisation**

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Santé mentale</b>					
Proportion de la population se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique <sup>11</sup>	24,2	31,5	40,4	↑	38,7
Proportion des travailleurs se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique liée à leur emploi principal actuel	N/D	17,6	23,6	↑	23,3
Proportion de la population ayant eu des symptômes de trouble de stress post-traumatique <sup>12</sup> au cours du dernier mois	N/D	N/D	* 4,4	N/D	4,0
Proportion de la population ayant ressenti des symptômes d'anxiété généralisée au cours des deux dernières semaines <sup>13</sup>	N/D	N/D	10,5	N/D	11,3
<b>Défavorisation et itinérance</b>					
Proportion de la population se percevant pauvre ou très pauvre	10,5	14,4	11,5	↓	13,2
Proportion de la population ayant déjà vécu un épisode d'itinérance <sup>14</sup>	N/D	N/D	* 2,6 (-)	N/D	4,7

(+, -) : Proportion lavalloise de 2020-2021 statistiquement plus élevée ou plus faible que de celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5 %.

↑/↓ : Augmentation ou diminution de la proportion statistiquement significative entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

N/D : Résultat non disponible.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

<sup>11</sup> La personne doit avoir obtenu un score élevé à l'échelle de Kessler.

<sup>12</sup> Une personne ayant vécu un événement si effrayant, horrible ou dérangeant au cours du dernier mois.

<sup>13</sup> Cela implique des symptômes tels que l'agitation, la fatigue, la tension musculaire, l'irritabilité, les problèmes de sommeil et la difficulté à se concentrer.

<sup>14</sup> Une personne sans domicile fixe, ayant habité dans des refuges ou des ressources d'hébergement d'urgence ou d'hébergement de transition, dans la rue, dans des édifices abandonnés, dans des cabanes (*shacks*) ou granges, ou dans une voiture, ou une personne qui était obligé(e) d'habiter temporairement chez quelqu'un ou dans un hôtel ou un motel, sans garantie de pouvoir y rester à long terme, parce qu'elle n'avait pas d'autre endroit où habiter.

## Principaux indicateurs sur les **pensées suicidaires et les tentatives de suicide**

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Pensées suicidaires et tentatives de suicide</b>					
Proportion de la population qui a songé sérieusement au suicide au cours de sa vie, excluant celle qui a déjà tenté de se suicider	9,9	8,7	8,3 (-)	=	10,0
Proportion de la population qui a songé sérieusement au suicide au cours de sa vie	13,0	11,4	11,5 (-)	=	14,0
Proportion de la population qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, excluant celle qui a tenté de se suicider au cours des 12 derniers mois	* 2,1	* 2,4	* 2,8	=	3,7
Proportion de la population qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois	* 2,4	* 2,6	3,2	=	4,2
Proportion de la population ayant tenté de se suicider au cours de sa vie	3,4	3,7	3,5	=	4,4
Proportion de la population qui a consulté un professionnel de la santé ou utilisé une ligne d'aide téléphonique à la suite de pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois	* 1,1	* 1,3	* 1,4 (-)	=	2,3

(+, -) : Proportion lavalloise de 2020-2021 statistiquement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

## Principaux indicateurs sur la **santé au travail**

	Laval				Ensemble du Québec
	2008 (%)	2014-2015 (%)	2020-2021 (%)	Comparaison entre 2020-2021 et 2014-2015 (↑↓=)	2020-2021 (%)
<b>Santé au travail</b>					
Proportion des travailleurs exposés aux gestes répétitifs des mains et des bras en milieu de travail	41,1	34,6	33,6	=	33,0
Proportion des travailleurs exposés à des manipulations de charges lourdes en milieu de travail	10,9	9,6	14,4	↑	15,7
Proportion des travailleurs exposés à du bruit intense en milieu de travail	* 4,3	6,9	7,0	=	8,4
Proportion des travailleurs travaillant en position debout de façon prolongée	43,8	39,7	38,7	=	39,2
Proportion des travailleurs ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois	26,7	36,8	43,6	↑	42,6
Proportion des travailleurs ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités personnelles ou familiales	N/D	N/C	17,9	N/D	17,9
Proportion des travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique ou sexuel au moins une fois au travail	N/D	21,2	11,5	↓	12,8
Proportion des travailleurs salariés exposés à un niveau faible ou modéré de soutien au travail de la part des collègues	N/D	21,4	16,8	↓	18,0
Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail	N/D	15,0	13,4	=	13,5
Proportion des travailleurs exposés à un niveau faible de reconnaissance au travail	N/D	24,2	23,2	=	23,1

↑/↓ : Augmentation ou diminution de la proportion statistiquement significative entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

= : Écart non statistiquement significatif entre les cycles 2020-2021 et 2014-2015, au seuil de signification de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

N/D : Résultat non disponible.

N/C : Résultat non comparable entre les cycles.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

## Principaux indicateurs sur les impacts de la pandémie de COVID-19

	Laval	Ensemble du Québec
	2020-2021 (%)	
<b>Impacts de la pandémie</b>		
Proportion de la population ayant ressenti de l'inquiétude depuis le début de la pandémie de COVID-19 concernant la santé d'un proche à risque de contracter la COVID-19	75,9	73,0
Proportion de la population dont le niveau de satisfaction à l'égard de sa vie sociale a diminué depuis le début de la pandémie de COVID-19	78,4	76,6
Proportion de la population ayant vécu des répercussions sur la capacité à respecter ses obligations financières en contexte de pandémie de COVID-19	29,0	25,9
Proportion des travailleurs actuels ayant perdu leur emploi en raison de la crise liée à la COVID-19 depuis le début de la pandémie de COVID-19	* 11,2	7,2
Proportion des travailleurs actuels ayant fait leur travail à domicile en raison de la crise liée à la COVID-19 depuis le début de la pandémie de COVID-19	23,1	24,6

NOTE : Aucun écart statistiquement significatif entre Laval et le reste du Québec.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

**Source** : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2020-2021.

Rédaction :

**Tigawendé Prosper Kaboré**, agent de planification, de programmation et de recherche, équipe de surveillance et vigie

**Céline Dufour**, coordonnatrice professionnelle, équipe de surveillance et vigie

**Sylvie Chrétien**, technicienne en recherche psychosociale, équipe de surveillance et vigie

Mai 2023. Une production de la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de Laval

Québec 