

ORDONNANCE COLLECTIVE (CONDENSÉE)

Initier des services diagnostiques, thérapeutiques et de consultation en cardiologie pour des usagers présentant de l'angine avec ou sans facteurs de risque ou douleur rétro-sternale atypique (DRS) avec des facteurs de risque

CLIENTÈLE VISÉE

Usagers admissibles à l'Accueil clinique, référés par un médecin de Laval et demandant une investigation en cardiologie pour angine avec ou sans facteurs de risque ou douleur rétro-sternale (DSR) atypique avec facteurs de risque identifiés.

INTENTION CLINIQUE

- Débuter rapidement un agent inhibiteur d'agrégation plaquettaire afin de prévenir les risques d'infarctus du myocarde.
- Offrir des services diagnostiques, thérapeutiques et de consultation en cardiologie à une clientèle présentant une condition clinique de nature subaiguë.

CONDITIONS D'INITIATION

- Référence d'un médecin provenant d'une clinique de Laval participante à l'Accueil clinique.
- Usager de 18 ans et plus.
- Clientèle ambulatoire : condition physique permettant les déplacements, hospitalisation non requise.
- Facteurs de risque de maladie coronarienne identifiés parmi les suivants : *Âge, sexe, hérédité, HTA, dyslipidémie, diabète, obésité, sédentarité, tabagisme, MCAS connue, maladie vasculaire connue.*
- Pour le pharmacien : s'assurer que le formulaire de liaison reçu s'applique à une ordonnance collective en vigueur qu'il détient.

CONTRE INDICATIONS à l'application de l'ordonnance collective

- Si depuis la réception de la référence médicale, l'usager présente :
 - Douleur thoracique non soulagée par la prise de nitro S/L à 3 reprises pour le même épisode.
 - Douleur thoracique de plus de 30 minutes dans les dernières 24 heures.
 - TA \geq 180/110 mmHG.
 - Augmentation des symptômes de fatigue et/ou d'essoufflement en lien avec l'épisode en cours.
- Usager sous anticoagulant oral, ex : Clopidrogel (Plavix^{md}) ou Warfarine (Coumadin^{md}) ou Acénocoumarol (Sintrom^{md}), Dabigatran (Pradax^{md}), Rivaroxaban (Xarelto^{md})
- Usager présentant une fibrillation auriculaire ancienne ou de novo.
- Usager connu avec MCAS **et** présentant DRS au repos.
- Usager allergique ou intolérant à l'AAS ou AINS.
- Usager présentant un saignement actif.

EN VIGUEUR LE : 23 juin 2011

N° : OC-014-2

DATE PRÉVUE DE RÉVISION :

Page : 1 De : 1