

GRILLE DE CERTIFICATION POUR L'INJECTION D'UN VACCIN

Prénom & nom du professionnel apprenant : _____

Titre d'emploi : _____ No. employé : _____ Date : _____

RÔLE AUTORISÉ : Usagers de tous les âges Usagers de 5 ans et plus

Étapes	Simulation, si indiqué	Observation clinique # 1	Observation clinique # 2	Observation clinique # 3
<i>Préciser la catégorie d'usager: adulte ou âge de l'enfant</i>				
<i>À cocher ✓ par l'évaluateur lorsque l'étape est observée et réussie. Si non applicable, inscrire N/A dans la colonne.</i>				
1. Se présente à l'usager et au parent/proche aidant.				
2. Effectue la double identification de l'usager.				
3. Valide les informations sur le formulaire de vaccination (évaluation complétée, consentement).				
4. Valide les caractéristiques du vaccin avec le formulaire (nom, présentation, apparence, posologie, mode de conservation, voie d'administration, date et heure de péremption).				
5. Procède à l'hygiène des mains (HDM).				
6. S'assure d'utiliser la bonne longueur et le bon calibre d'aiguille en fonction du site d'injection et de l'usager.				
7. S'assure de positionner adéquatement l'usager.				
8. Utilise un ou des moyens de distraction pour atténuer l'anxiété et la douleur, si nécessaire.				
9. Sélectionne le bon site d'injection en fonction de l'usager. À préciser : deltoïde ou vaste-externe ?				
10. Désinfecte la peau par des mouvements circulaires avec un tampon d'alcool pendant 15 secondes sur une surface de 5 cm autour du site d'injection.				
11. Retire le bouchon protecteur de l'aiguille.				
12. Repère le bon endroit où effectuer l'injection intramusculaire (triangle inversé pour muscle deltoïde).				
13. Positionne la peau de façon appropriée pour l'usager : - Tendre fermement la peau entre l'index et le pouce - Pincer le muscle entre le pouce et l'index (pour l'usager maigre ou cachexique).				
14. Enfonce l'aiguille à un angle de 90° d'un mouvement sûr et rapide.				
15. Injecte rapidement le produit, sans retirer au préalable.				
16. Retire l'aiguille d'un mouvement rapide, en suivant l'angle d'introduction.				
17. Dispose la seringue et l'aiguille dans un bac biorisque.				

