DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

Mars
2022

CENTRE INTÉGRÉ
DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX
DE LAVAL

FORMATION DE TRONC COMMUN POUR LES UNITÉS DE CHIRURGIES

Portion théorique

Suzanne Thibeault, conseillère en soins infirmiers
Jacinthe Collin, conseillère clinique

Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

PLAN DE LA FORMATION

- Objectifs de la formation
- Trajectoire opératoire
- ERAS
- Phase préopératoire
- Phase périopératoire
- Phase postopératoire
 - Types de chirurgies - 9 spécialités
 - Complications en période postopératoire
 - Enseignement postopératoire
 - Congé postopératoire

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Connaître les différents outils de documentation reliés au bloc opératoire et être en mesure de préparer un usager pour une intervention chirurgicale ;
2. Connaître les différents protocoles infirmiers, ordonnances collectives et ordonnances médicales / suivis systématiques pour la phase postopératoire ;
3. Optimiser son jugement clinique en regard d'un usager ayant subi une intervention chirurgicale ;
4. Être en mesure d'intervenir auprès d'un usager en période postopératoire dans une optique ERAS.

TRAJECTOIRE OPÉRATOIRE

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

TRAJECTOIRE OPÉRATOIRE

- CDJ : Chirurgie d'un jour

Préadmission : chirurgies électives, semi-urgentes et urgentes plus de 72 heures
Chirurgies urgentes (moins 72 heures) : ne passeront pas par la préadmission

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

TRAJECTOIRE OPÉRATOIRE

- Chirurgies urgentes (moins 72 heures)

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE AVEC HOSPITALISATION

- CJA (chirurgie jour admission)
- CDJ (chirurgie d'un jour)
- Hospitalisation :
 - 4EN
 - 4ES
 - 5OS
 - 5ES (quelques lits)
 - 5ON (quelques lits)
 - Pédiatrie
 - MEF

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ERAS

Enhanced Recovery After Surgery
(Optimisation du rétablissement
postopératoire)

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHEMINEMENT ERAS

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

PHASE PRÉOPÉRATOIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ENSEIGNEMENT PRÉOPÉRATOIRE

Clinique de préadmission

- Remise de guide de préparation préopératoire
- Asepsie de la peau et rasage
- Préparation intestinale
- Diète préopératoire : PI-056
- Exercices respiratoires
- Levée précoce
- Restriction du tabac

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval

Québec

PI-056 Initier le jeûne opératoire

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

2.2 Usager admis le jour de sa chirurgie (chirurgie électorive)

- Lors de l'appel à l'utilisateur lui indiquant l'heure à laquelle il doit arriver, préciser les consignes :

Heure d'arrivée de l'utilisateur	Heure à laquelle l'utilisateur doit cesser de boire		
	Tous les usagers Enfant < 2 ans	Enfant < 2 ans	
	Liquides clairs (Jeûne minimal 2 h avant la chirurgie)	Lait maternel (Jeûne minimal 4 h avant la chirurgie)	Lait en préparation commerciale pour nourrisson (PCN) ou lait de vache (Jeûne minimal 6 h avant la chirurgie)
Avant 10 h	6 h	4 h	2 h
À partir de 10 h	8 h	6 h	4 h
Chirurgie sur appel (utilisateur à domicile)	11 h	9 h	7 h

2.3 Usager déjà hospitalisé avant sa chirurgie :

Heure à laquelle l'utilisateur doit cesser de boire		
Tous les usagers Enfant < 2 ans	Enfant < 2 ans	
Liquides clairs (Jeûne minimal 2 h avant la chirurgie)	Lait maternel (Jeûne minimal 4 h avant la chirurgie)	Lait en préparation commerciale pour nourrisson (PCN) ou lait de vache (Jeûne minimal 6 h avant la chirurgie)
6 h	4 h	2 h

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval

Québec

DIGNE DE CONFIANCE, à chaque instant

OC-095

Initier la préparation opératoire pour la clientèle de la clinique de préadmission subissant une intervention chirurgicale

A-Saro et/ou ERV et/ou CARBA-A-Saro et/ou ERV et/ou CARBA
FEUILLE DE ROUTE DE LA CLINIQUE DE PRÉADMISSION

Identification de l'utilisateur: **MONSIEUR X 62 ans**

Date de préparation du dossier: 17 DEC 2020

Renseignement sur l'intervention:
Chirurgiens: Dr **Opératoire** Intervention: **Prothèse totale du genou (PTG)** Opération prévue: 15 FEV 2021 Type de visite: **Hospitalisation** Remarques: **Pronté Écitif**

Examen requis	Fait en préadmission. À valider avant départ au bloc	Realisé	Valider	Remarque
A-Histoire de cas		25 JUIL 2020		
A-MAJ		07 DEC 2020	Fait	
A-Saro et/ou ERV et/ou CARBA		07 DEC 2020		
CONS. PHYSIO				Pas fait = COVID
Labo-H. code 50		07 DEC 2020		Si révision = 2 ☒ 4
Labo-Bio-Creat.		07 DEC 2020		USAGER diabétique
Labo-Bio-E+		07 DEC 2020		USAGER sous IECA (Altace)
Médecine interne				Annulé
Anesthésiologiste		07 DEC 2020	OK	
Rx-Ambio				À valider au bloc
Rx-genou (bilan axial)		12 DEC 2020		CLSC Ste-Rose
Mesure de bas artériel		17 DEC 2020		
ECG		07 DEC 2020		ECG si, au moins un facteur de risque ci-dessous: Plus de 55 ans MCASINQAS AVC/ICT Insuffisance cardiaque Diabète IRC (DFGe < 60 mL/min) Cardiopathies autres

Particularités

Cesser médicament ☒ ALTACE (24h) ☐ MR ☐ Pré RTU	Labo à l'admission ☒ Banque de sang ☐ Sang autologue ☒ Glucomètre	☐ Test grossesse ☐ Sang Coélat. ☐ E*	Convalescence Autres: APL OU CLSC
--	---	---	--------------------------------------

Commentaires: **Barrière linguistique = italien. Parle peu français**

Reservé à la clinique de préadmission

CIA CDU Adm veille RV préad 13 DEC 2020 9h00 Patient BV

Enseignement pré-op oui non Liste médicaments pharmacie

Dossier complet, sauf: oui non

Dossier complet oui non

Signature de l'infirmière: **Infirmière X** Date: 17 DEC 2020

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

VÉRIFICATIONS DES SOINS PRÉOPÉRATOIRES
Préparation opératoire chirurgies urgentes et avant départ salle op

Partie A-B-C peut être complétées par AIC et/ou infirmière

Partie D doit être complétée par infirmière et/ou infirmière auxiliaire

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Québec

VÉRIFICATION DES SOINS PRÉOPÉRATOIRES

Date : ____-____-____ heure ____:____:____

Chirurgien : Dr XYZ

Intervention : **hémicolectomie droite par laparoscopie**

dossier

chambre

Nom Prénom

Signes vitaux	TA : 128/70	Pls : 80	CF : ____	T° : 36.8 B	Fréquence resp.(/min)	Amplitude resp. (P.S.N) : N	Saturation (%)	O2 (L/min)
Heure :					20		99%	AA
Poids : 65KG	Taille : 181 cm				Requis/au dossier	Non requis		Remarques

A. LABORATOIRE

Hg et Ht si > 60 ans

Béta HCG pour toutes femmes dès le début des menstruations et jusqu'à 1 an après la fin des menstruations

Sang en réserve : quantité : code 50

Electrolytes (si prend diurétique)

Labo du jour : Exemple INR, glycémie

Autres labos :

B. EXAMENS

ECG si plus de 40 ans (homme) ou si plus de 50 ans (femme)

ECG si insulindépendant ou hypertendu sous médication (peu importe l'âge)

Autres :

C. DOSSIER

Consultation par spécialiste, exemple : endocrinologue

Consentement opératoire signé et validé (+ cdx stérilisante pm)

Consentement d'anesthésie signé et validé

Demande de soins intensifs

Dernière hospitalisation ou visite médicale numérisée

Histoire de cas

Formulaire d'ordonnances postopératoires

Carte CSL

Date et expiration de la carte assurance maladie validée Expiration : 2021

Signature : *Suzanne Thibault*

D. SOINS INFIRMIERS « A VALIDER AVANT DÉPART POUR S-OP » Oui Non-applicable

A jeun depuis : date : ____ du jour : ____ heure : 0H00

Allergie : Exemple : codéine, iodo, latex

Bracelet allergie Bracelet identifié en place et vérifié

Bain - douche (avec savon antiseptique)

Rasage opératoire avec tondeuse électrique

Prothèses dentaires retirées Prothèse capillaire retirée

Prothèse auditive D G en place lentilles cornéennes retirées

Vernis à ongles et maquillage retirés Lunettes retirées

Vernis bio gel ou faux ongles retirés si en place éviter bloc opératoire

Bijoux et vêtements enlevés sinon compléter la feuille « Refus de retirer les bijoux et/ou autres objets lors d'une intervention chirurgicale »

Lavage des mains : résultat : efficace retour clair Exemple : Golyte-4 litres

Sonde vésicale Miction au départ

Préfil de médicaments au dossier Prémédication à l'appel donnée

Client isolé : Non Oui Spécifiez : Contact Respiratoire Strict Préf. gouttelettes Protection Contact+ Contact et gouttelette

Signature : Signature de l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire qui valide la section D

NE PAS OUBLIER
OC-132
ADMINISTRATION
ACÉTAMINOPHÈNE
À L'APPELSOP

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

MOMENTS D'ADMINISTRATION DES ANTIBIOTIQUES EN PRÉOPÉRATOIRE

Attention : Toujours utiliser la méthode de dilution et la vitesse d'administration qui sont inscrites sur l'étiquette de la pharmacie car elles peuvent être différentes de celles du guide mini-perfuseur.

ANTIBIOTIQUES	A L'APPEL SOP – À L'ÉTAGE OU À LA CHIRURGIE D'UN JOUR	AU DÉPART SOP – À L'ÉTAGE OU À LA CHIRURGIE D'UN JOUR	AVANT INDUCTION – AU BLOC OPÉRATOIRE
Ampicilline (Ampicin ^{MD})		Ampicilline 2 g	Ampicilline 1 g
Céfazoline (Kefzol ^{MD} ou Ancef ^{MD})			X
Céfoxitine (Mefoxin ^{MD})			X
Ceftriaxone (Rocephin ^{MD})			X
Ciprofloxacine (Cipro ^{MD})	X		
Clindamycine (Dalacin C ^{MD})		X	
Gentamicine (Garamycine ^{MD})	X		
Métronidazole (Flagyl ^{MD})		X	
Pénicilline G (Crystapen ^{MD})		X	
Pipéracilline-Tazobactam (Tazocin ^{MD})		X	
Tobramycine (Nebcin ^{MD})	X		
Vancomycine	X		

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Québec

Hôpital de la Cité-de-la-Santé – Département de pharmacie CSSSL
 J:\DSP7 - PHARMACIE\7.6 Affaires professionnelles\PGTM\Protocoles et autres documents\Moments d'administration des antibiotiques en préopératoire MAJ2018.doc

Mise à jour : 2018-05-17

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

PHASE PÉRIOPÉRATOIRE

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

TOMIE VS SCOPIE

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

LES POSITIONS DURANT LA CHIRURGIE

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

PHASE POSTOPÉRATOIRE

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

RETOUR DE LA SALLE D'OPÉRATION

Préparation de la chambre

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

RETOUR DE LA SALLE D'OPÉRATION

Au retour de la salle d'opération, quels sont les éléments essentiels à consulter dans le dossier?

- Variables opératoires salle d'opération
- Salle de réveil
- Note d'évolution postopératoire
- Formulaires ordonnances post opératoire

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

VARIABLES OPÉRATOIRES
Salle d'opération

Hôpital de la Cité-de-la-Santé DT0588

VARIABLES OPÉRATOIRES
SALLE D'OPÉRATION

Information sur l'opération
 Date d'opération : 2019/04/23
 Entrée en salle : 08:04
 Sortie en salle : 11:12
 Statut et détail de l'opération :
 Informations complémentaires : Oncof Eras

Opér. proposée : **Diagnostic préop**
 Polype suspect non résectable colon droit

Opér. réalisée : **Intervention, localisation**
 Hémiectomie droite par laparoscopie

Intervenant : **Intervenant**
 Cyt, Dominique DC DESJARDINS-ST-JEAN, OLIVIER
 Gagnon, Sylvie Sgo Infirmière
 Lafleur, Huguens Infirmière
 Scaram, Daisy DS Infirmière-auxiliaire

Évaluation Préopératoire
 Évaluation du patient : À jeûn, Ident. pt et bracelet, PTAPCI(sgo/fati), Site opératoire, Verific interv & consent
 Vérifié par : sgo
 Allergie : Pénicilline
 État de conscience : Alerte/Orienté
 Peau : Intacte / Normale
 Fonctions sensorielles : Sans restriction
 Prothèses : Aucune
 État musculosquelettique : Sans restriction
 Transfert à la salle d'opération via : Civière

Suivi peropératoire
 Médication :
 08:40 ANCEF (Cefazoline) 2g I.V.
 08:40 Héparine 10000ml 0.5ml S/C
 Marcaine 0.25% + épinéphrine
 INFILTRATION
 INSTILLAGEL (xylo 2% + chlohexidine) GEL

Équipement :
 Équipement : # modèle # série Puissance Pression Débit Quantité
 Notes # série # série # série # série
 Prothèse : Nom # Lot Modèle # Stérilisation Info. Compl. Manufacturier # série Taille

Agrafeuse chirurgicale linéaire coupante (GIA 90, 11, 20)

VARIABLES OPÉRATOIRES
Salle d'opération

Spécimen de laboratoire : Type de spécimen : Spécimen Localisation : Commentaire :
 Pathologie - État frais Colon droit -leon dép.10h38

Irrigation : Type : Quantité :
 NaCl 0.5% 3000ml

Rayons X : Type : Site : Heure :

Dispositif protecteurs :
 Surveillance :
 Greffes : Greffes Type : Donneur : Receveur :

Données cliniques
 Risque d'infection :
 Site opératoire : Peau intacte Non : Site : abdomen Par : sgo
 Brosage Par : Badigeon Par : Dr.Belhumeur

Désinfectant : PROVIODINE iodée 10% éponge(kit à sonde), TEINTÉE ROSE Chlor. 2% / alc70% éponge

Risque d'atteinte à l'intégrité
 Position du patient : Décubitus dorsale
 Dispositifs de positionnement :
 Protection des proéminences osseuses : 1 Bas côté/ Aklise/get/appui-bras opposé, Positionné par : Positionné par : EQUIPE

Risque élevé de brûlure
 Électrochirurgie : Élec. retour Site électro. Type électro. Unité État peau postop Coag
 Par : Vér. Rasage par Site rasage # 4 GBM ACTIF # 0/40 20/40
 sgo/sgo : Cuisse gauche Monopolaire 001081 Intact/ Normale
 sgo/sgo : Autre. Thunderbeat Thunderbeat #1 #5060 2 1
 Intact/ Normale

Autre : Ceinture de sécurité : Jambes

Laser : Laser Type : Puissance : # Série : Heure : Mesure de sécurité précise
 Gauche Débit # Série Site État peau postop Grandeur Resp. Pression Commentaire

Dispositifs : Dispositif inséré par Taille Commentaire Type Site Heure
 Bas anti-embolique + Jambières séquentielles sgo en fonction
 Sonde vésicale Foley # 16Fr 2 voies dr. Belhumeur 10 cc ballonnet retour urine clair 06:57
 STERI-STRIP / TELFA

Évaluation postopératoire :
 Patient transféré vers : Via : Civière

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRAIRE

Note infirmière pour le retour postopératoire / admission

Retour postopératoire

- **Retour de So en civière dans la chambre 475-1. Transfert au lit aide X3. Patient léthargique avec présence de ronflement. Patient se plaint de douleur à l'abdomen surtout au site opératoire sous forme de coups de poignard quantifiée à 7/10 avec irradiation au dos. Aucune nausée. Ventimask 40% en place, SaO2 à 97%. O2 ajusté selon OC-097. Canule courte en place #20 main gauche, soluté perfuse bien, bon retour veineux. Pansement opératoire ombilical propre. 2 plaies de scopies sur l'abdomen, stéristrip en place aucun écoulement. Sonde vésicale draine urine jaunâtre. Bas antiemboliques et séquentiels en place. Protocole de SV débutés. Dosage IIE débuté. Cloche appel à sa portée, conjointe au chevet.**

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRAIRE

Ordonnance médicale
individuelle / suivi
systématique

Ordonnance médicale
suivi épurale /
épimorphe

PI-048 Surveillance
signes vitaux en
période
postopératoire

PI-018 Évaluation et
surveillance d'un
usager qui reçoit
opiacé

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Niveau de sédation

Niveau de sédation	Description
0	Éveillé
1	Endormi, facilement éveillable
2	Endormi, difficilement éveillable
3	Endormi, ne peut être réveillé même à la stimulation

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Évaluation de la douleur

Échelle d'intensité de douleur

Source : CISSS de Laval (2018) ERAS

Se référer aux échelles d'évaluation d'intensité de la douleur disponibles sur le Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRAIRE

Anesthésie générale

- S.A.G. + I.E.T. = Sous anesthésie générale + intubation endotrachéale
- Dépression du SNC
- Bloque le stimulus de la douleur dans le cortex cérébral

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRAIRE

Anesthésie générale

PI-048

Signes vitaux	Surveillance
Dans tous les cas, la stabilité des signes vitaux est requise avant de passer au pallier suivant	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ État de conscience ▪ Sédation ▪ Tension artérielle (Pour les enfants < 10 ans, prendre TA seulement si : <ul style="list-style-type: none"> ○ Instabilité des autres signes vitaux ○ Détérioration de l'état clinique ○ Conditions associées) ▪ Fréquence cardiaque ▪ État respiratoire (fréquence, rythme, amplitude, ronflement) ▪ Saturation en oxygène ▪ Douleur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. À l'admission 2. q 15 minutes X 1 h 3. Si stables : q 1 h X 2 h 4. Si stables : q 6 h ou QID X 48 h** 5. Si stables : q 8 h ou TID jusqu'au congé** <p>**Pour les enfants < 14 ans, respecter sommeil et mesurer uniquement fréquence cardiaque et état respiratoire. Saturation en oxygène et autres paramètres PRN (pallier 4 et 5 seulement).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Température 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'heure suivant l'admission de l'usager 2. Si stables : q 6 h ou QID X 48 h 3. Si stables : q 8 h ou TID jusqu'au congé

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Anesthésie régionale - rachidienne ou épidurale

- L'usager est éveillé et conscient de ce qui se passe.
- Médicaments utilisés: Bupivacaïne, Xylocaïne

Épidurale:

- Injections d'agent anesthésique dans l'espace entourant la dure-mère au niveau thoracique, lombaire et sacrée.

Rachidienne:

- Introduction d'un agent anesthésiant local dans l'espace sous-arachnoïdien (L4).
- Rachi simple ou Épimorphe.

Échelle de Bromage Évaluation du bloc moteur sensitif

Évaluation du bloc moteur post-anesthésie Échelle de Bromage		
Score		
0		Absence de bloc moteur. Capable de soulever le membre inférieur tendu au-dessus du plan du lit. <i>Attention : s'assurer de la mobilité et la sensation des talons et du bassin par l'usager avant le premier lever.</i>
1		Incapable de surélever les jambes étendues. Tout juste capable de bouger les genoux et les pieds.
2		Incapable de fléchir les genoux. Capable uniquement de bouger les pieds.
3		Bloc moteur complet. Incapable de fléchir les chevilles et de bouger les hanches, genoux et pieds.

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Particularités associées à la rachidienne en dose unique

PI-048

Signes vitaux	Surveillance
Dans tous les cas, la stabilité des signes vitaux est requise avant de passer au pallier suivant	
<ul style="list-style-type: none"> État de conscience Sédation Tension artérielle (Pour les enfants < 10 ans, prendre TA seulement si : <ul style="list-style-type: none"> Instabilité des autres signes vitaux Détérioration de l'état clinique Conditions associées) Fréquence cardiaque État respiratoire (fréquence, rythme, amplitude, ronflement) Saturation en oxygène Douleur 	<ol style="list-style-type: none"> À l'admission q 15 minutes X 1 h Si stables : q 1 h X 2 h Si stables : q 6 h ou QID X 48 h** Si stables : q 8 h ou TID jusqu'au congé** <p>**Pour les enfants < 14 ans, respecter sommeil et mesurer uniquement fréquence cardiaque et état respiratoire. Saturation en oxygène et autres paramètres PRN (pallier 4 et 5 seulement).</p>
Température	<ol style="list-style-type: none"> Dans l'heure suivant l'admission de l'utilisateur Si stables : q 6 h ou QID X 48 h Si stables : q 8 h ou TID jusqu'au congé
Bloc moteur et sensitif (si applicable)	À la même fréquence que les autres paramètres, jusqu'à résolution.

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Particularités associées à l'Epimorphe

SURVEILLANCE
<ul style="list-style-type: none"> État respiratoire, douleur et sédation <p>PENDANT les 15 premières heures → Aux heures jour et soir, aux 4 h la nuit</p> <ul style="list-style-type: none"> Autres signes vitaux selon PI-048 : Surveillance des signes vitaux en période postopératoire Garder un accès veineux pendant 15 heures après l'injection épidurale ou rachidienne VOIR VERSO si administration de doses concomitantes (PO, IM, S/C ou IV) <p>⇒ Ordonnance valable pour 24 heures</p>

Ordonnance ANALGÉSIE RACHIDIENNE OU ÉPIDURALE EN DOSE UNIQUE (Épimorphe™)

Ne pas donner d'autres analgésiques ou relaxants sans l'accord de l'anesthésiologue pour la durée du protocole

MÉDICATION : Morphine (Epimorphe™) 0,5 mg/mL _____ mg injecté à _____ h

CO-ANALGÉSIE : Maximum de 4 g d'acétaminophène par 24 heures

Ne pas donner de corticostéroïdes basés sur des prescriptions validées autre qu'épidurale (PRN)

Acétaminophène _____ mg PO / R _____ mg SC q 3 h PRN

naproxène 500 mg PO / R _____ mg SC q 3 h PRN

Cloxacil / Clavulanate™ 100 mg _____ mg PO BID régulier

OPACÉS : Morphine _____ mg PO q 3 h PRN _____ mg SC q 3 h PRN

Hydrocodone _____ mg PO q 3 h PRN _____ mg SC q 3 h PRN

Oxycodone _____ mg PO q 3 h PRN _____ mg SC q 3 h PRN

SÉDATION : Lorazepam (Ativan™) _____ mg PO / EL HS PRN

SI MALDES : voir formulaire d'ordonnance analgésie postopératoire et respecter ordonnances concernant nausées / vomissements et constipation

SI PRURIT : Diphenhydramine (Benadryl™) _____ mg IV / tubulaire en 2 min aux 8 h PRN

Si douleur après 30 min : Naloxone (Nexmar™) 0,1 mg (0,1 mL de 1 mg/mL) à 0,2 mg (0,2 mL de 1 mg/mL) en 1 min

Si douleur après 15 min : Clonidine (Catapres™) 0,1 mg (0,1 mL de 1 mg/mL) en 1 min

SI DÉPRESSION RESPIRATOIRE : Respiration O₂ 10 L par 15 min et sédation 2-3 (voir annexes)

Donneur Naloxone™ (Nexmar™) 1 mL tubulaire

0,10 % par 15 minutes et dosage anesthésiologique

SURVEILLANCE

- État respiratoire, douleur et sédation
- PENDANT** les 15 premières heures → Aux heures jour et soir, aux 4 h la nuit
- Autres signes vitaux selon PI-048 : Surveillance des signes vitaux en période postopératoire
- Garder un accès veineux pendant 15 heures après l'injection épidurale ou rachidienne
- VOIR VERSO si administration de doses concomitantes (PO, IM, S/C ou IV)
- ⇒ Ordonnance valable pour 24 heures

Date : _____ Heure : _____ Signature du médecin : _____ W À joindre

03/2022 Ordonnance - Analgésie rachidienne/épidurale (dose unique) (Épimorphe™) 1 de 1

03/2022 Copie pour l'histoire Copie pour l'histoire Copie pour l'histoire

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRAIRE

Particularités associées à l'Epimorphe

- Surveillances lors de l'administration concomitante d'opiacés :

ADMINISTRATION CONCOMITANTE	PARAMÈTRES À MONITORER	FRÉQUENCE
OPIACÉS PO	Douleur, sédation, état respiratoire*	30 min après l'administration
OPIACÉS S/C OU IM	Douleur, sédation, état respiratoire*	q 30 min x 3 puis q 1 h x 1 soit 30-60-90 et 150 min post administration
OPIACÉS IV	Douleur, sédation, état respiratoire*	q 5 min x 2 puis q 10 min x 3 soit 5-10-20-30 et 40 min post administration

* **État respiratoire** : Fréquence, amplitude, ronflement et la SaO₂

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRAIRE

Particularités associées à l'épidurale en continu

- Au début du quart de travail, vérifier que les données de la pompe concordent avec l'ordonnance
- À la fin du quart de travail, faire le dosage de la pompe

SURVEILLANCE :	
▪ État respiratoire, douleur et sédation :	
PENDANT les 12 premières heures → Aux heures jour et soir et aux 4 h la nuit	
APRÈS les 12 premières heures → Aux 4 h jusqu'à la fin de la perfusion épidurale. Ne pas réveiller la nuit	
▪ Autres signes vitaux : Chirurgie → suivre le protocole # 169 Gynécologie-obstétrique → suivre le protocole #15	
▪ Bloc moteur aux 4 h si le patient reçoit de la bupivacaine (Marcaine®) ou ropivacaine	
▪ Si bloc moteur à 3 x 4 h ou à 2 x 8 h après le début de la perfusion épidurale, aviser l'anesthésiologiste	
▪ Garder un accès veineux pendant 8 heures après avoir cessé la perfusion épidurale	
▪ Voir verso si administration de doses concomitantes (bolus via pompe, PO, IM, S/C ou IV)	
⇒ Ordonnance valable pour 7 jours	

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Particularités associées à l'épidurale en continu

- Surveillances lors de l'administration concomitante de bolus d'épidurale ou opiacés :

ADMINISTRATION CONCOMITANTE	PARAMÈTRES À MONITORER	FRÉQUENCE
BOLUS VIA POMPE	TA et pouls	q 5 min x 3
	Douleur Sédation	État respiratoire* Bloc moteur
OPIACÉS PO	Douleur, sédation, état respiratoire*	30 min après l'administration
OPIACÉS S/C ou IM	Douleur, sédation, état respiratoire*	q 30 min x 3 puis q 1 h x 1 soit 30-60-90 et 150 min post administration
OPIACÉS IV	Douleur, sédation, état respiratoire*	q 5 min x 2 puis q 10 min x 3 soit 5-10-20-30 et 40 min post administration

* État respiratoire : Fréquence, amplitude, ronflement et la SaO₂

RENDREZ-VOUS POUR LES MÉDICAMENTS PÉRIDURAUX ET LES OPIACÉS

1. DOULEUR (ÉCHELLE D'ÉVALUATION)

2. SÉDATION

3. SURVEILLANCE

ADMINISTRATION CONCOMITANTE	PARAMÈTRES À MONITORER	FRÉQUENCE
Bolus IV	Douleur, sédation, état respiratoire*	30 min après l'administration
Bolus SC ou IM	Douleur, sédation, état respiratoire*	q 30 min x 3 puis q 1 h x 1 soit 30-60-90 et 150 min post administration
Bolus PO	Douleur, sédation, état respiratoire*	30 min après l'administration

* État respiratoire : Fréquence, amplitude, ronflement et la SaO₂

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Particularités associées à l'épidurale en continu

- DVI / Double vérification indépendante

Dans quelle situation?

- Vérification initiale à l'arrivée sur l'unité
- Changement de sac
- Toute modification de débit
- Tous les bolus
- Arrêt (quantité restante)

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Particularités associées à l'épidurale en continu

➤ Surveillance du cathéter

- Mesurer le cathéter du site d'insertion au niveau de la peau jusqu'à la jonction de l'embase et de la tubulure OU vérifier l'emplacement du repère visuel sur le cathéter

exemple de repère visuel :

- 4 points collés = 20 cm
- 3 points collés = 15 cm
- 2 points collés = 10 cm
- distance entre chaque point isolé = 1 cm

Avec la permission du CSSS Champlain_Charles-Le Moyne

ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DE L'USAGER EN POSTOPÉRATOIRE

Particularités associées à l'épidurale en continu

➤ Surveillance du cathéter

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

ANESTHÉSIE

www.icslq.org

BLOC NEURAXIAL	BLOC PÉRIPHÉRIQUE
Type: ☐ Epidurale ☐ Rachi ☐ Combinée	Type de bloc: _____ ☐ Droit ☐ Gauche
Position: ☐ Assise ☐ Décubitus latéral ☐ D ☐ G	☐ Salle d'induction ☐ Salle d'opération
Niveau: _____ ☐ Médian ☐ Para-médian ☐ D ☐ G	Position: ☐ D, dorsal ☐ D, latéral ☐ D ☐ G ☐ D, ventral
☐ Gants stériles-Masque-Bonnet ☐ Blouse stérile	☐ Gants stériles-Masque-Bonnet
☐ Asepsie avec Chlorhexidine 2%-Alcool IPP 70% x 3	☐ Asepsie avec Chlorhexidine 2%-Alcool IPP 70%
☐ Champs stériles	☐ Champs stériles ☐ Gaine stérile
Anesthésie locale: _____ mL	Anesthésie locale: _____ mL
Spine # _____ G _____ mm:	☐ Échoguidage ☐ Neurostimulation
Cathéter épidural: _____ cm peau _____ cm espace	☐ In-plane ☐ Out-of-plane
☐ Parasthésie: _____	Aiguille: _____ mm _____ G
Titre dose: _____	☐ Cathéter: _____
Bolus: _____	☐ Sang ☐ Parasthésie: _____
Whitacre # _____ G _____ mm:	Bc: ☐ Ropivacaine _____ % ☐ Épinéphrine: _____ mL
	☐ Autre: _____
	Détails: _____

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

TYPES DE CHIRURGIES – 9 SPÉCIALITÉS

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

TYPES DE CHIRURGIES

9 spécialités à l'hôpital Cité-de-la-Santé :

- Chirurgie générale
- Gynécologie
- ORL
- Orthopédie
- Urologie
- Vasculaire
- Bariatrique
- Plastie
- Chirurgie buccale

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE GÉNÉRALE

➤ Exemples : appendicectomie, splénectomie, sigmoïdectomie, colectomie, mastectomie, etc.

Dispositifs de soins : pansement, drain, TNG, stomie, sonde, BAE, bas séquentiels

Particularités : soins et surveillances stomie

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval

OR DONNANCES POSTOPÉRATOIRES POUR
CHIRURGIE GÉNÉRALE
MÉDICAMENTS

Poids : _____ kg Taille : _____ cm Allergies : _____ Intolérances : _____

SOLUTÉS

Debit:

60 mL / h D5 % ½ Salfin D5 % NaCl 0,9 % Autre : _____

Autre : _____ mL / h 20 mEq KCl/L 40 mEq KCl/L Autre(s) : _____

Cesser soluté au Jour 1 6h00 am si s'hydrate bien, garder accès veineux.

MÉDICAMENTS (N.B. Vérifier si l'usager a DES ALLERGIES)

Lait de magnésie 30 mL PO BID REG x 48h (excluant usagers avec iléostomie)

Si ACP, considérer cesser au Jour 1 si absence de nausée et diète tolérée, avec accord de l'anesthésiologiste.

THROMBOPROPHYLAXIE → exclure usagers en chirurgie d'un jour (CDJ)

Jour 0 : Héparine 5000 unités SC HS (délai minimal entre dose à l'induction et dose HS : 8 heures)

Des Jour 1 (délai minimal entre Héparine 5000 unités SC HS et Lovénox 40 mg SC DIE : 8 heures)

Encoxaparine (Lovenox^{MD}) 40 mg SC DIE 30 mg SC DIE si CLcr inférieure à 30 mL/min ou poids inférieur à 45 kg

Dalhéparine (Fragmin^{MD}) 5000 unités SC DIE

Héparine 5000 unités SC BID ou TID Héparine 2500 unités SC BID ou TID

OBÉSITÉ (voir verso - particularités)

Encoxaparine (Lovenox^{MD}) 30 mg SC BID 40 mg SC BID 60 mg SC BID

Dalhéparine (Fragmin^{MD}) 7500 unités SC DIE

Héparine 7500 unités SC BID ou TID

THROMBOPROPHYLAXIE AU CONGÉ (VOIR RX DÉPART) : ENSEIGNEMENT AUTO-ADMINISTRATION

ANTÉCÉDENTS DE TSP : Fondaparinux (Arixtra^{MD}) 2,5 mg SC DIE si poids supérieur à 50 Kg et Clr supérieure à 30 mL/min

Si contre-indication pharmacologique ou en ajout : Bas à compression intermittente Bas anti-emboliques

ANESTHÉSIOLOGIE : _____

Autre(s) : _____

SIGNATURE

Date : _____ Heure : _____ Signature du médecin : _____ N° de permis : _____

68-000-542
Rev. : 2018-02-01
Copie: Médecin - Dossier médical

OR DONNANCES POSTOPÉRATOIRES POUR CHIRURGIE GÉNÉRALE - MÉDICAMENTS 1 de 1
Copie: Jureur - Pharmacie

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval

OR DONNANCES POSTOPÉRATOIRES POUR
CHIRURGIE GÉNÉRALE
TRAITEMENTS

TRAITEMENTS

Lever précoce 3h post congé salle de réveil ou avant selon l'état de l'usager

Ou :

Fauteuil q repas

Mobilisation TID dès Jour 1

Respirex x 5 min q 1 h

Dosage ingesta-excreta q 8 h ou : _____

Aviser si diurèse moins de 160 mL / 8 heures ou :

Pansement : cesser Jour 2. Pansement PRN ensuite ou :

Drain : _____ Cesser : _____

Mastectomies : cesser le drain lorsque ≤ 20 mL X 2 jours consécutifs

Levine drainage libre _____ Cesser : _____

Sonde vésicale : Cesser Jour 1 - 6 h Autre : _____

Gomme à mâcher TID (débiter en salle de réveil)

Pour les chirurgies générales :

Diète : dès le Jour 0 : Légère + suppléments TID + collations PRN Autre : _____

Diète diabétique

Pour les chirurgies bariatriques ou gastriques :

Diète Jour 0 : eau pour confort

Diète Jour 1 : liquide banatrique

Usager stomisé : aviser stomothérapeute et infirmière de liaison Jour 1 am

Pas de manœuvre rectale

LABORATOIRES ET EXAMENS DIAGNOSTIQUES (PER HOSPITALISATION)	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 8
☐ FSC, Electrolytes, Créatinine				
☐ Autre :				

CONGÉ

Congé : _____ Rendez-vous : _____ semaines post congé

CLSC (compléter référence interétablissement) Clinique externe de chirurgie Clinique du sein

Reprendre anticoagulants : _____ dans : _____ jours

Reprendre antiplaquettaires : _____ dans : _____ jours

Date : _____ Heure : _____ Signature du médecin : _____ N° de permis : _____

68-000-542
Rev. : 2018-10-18
Dossier: médical

OR DONNANCES POSTOPÉRATOIRES POUR CHIRURGIE GÉNÉRALE - TRAITEMENTS 1 de 1

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval

DIGNE DE CONFIANCE, à chaque instant

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Soins et surveillances des stomies digestives

<http://enfestaupa.blogspot.ca/p/estomias.html>

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Québec

DIGNE DE CONFIANCE, à chaque instant

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Soins et surveillances des stomies digestives

	Observations / interventions				Observations / interventions		
	N	J	S		N	J	S
9. Élimination vésicale et intestinale (É)	Particularité de l'élimination*			Date de la dernière selle :			
	Mode d'élimination N ___ J ___ S ___ 1) Toilette 2) Chaise d'aisance 3) Bassine/Urinal 4) Culotte de protection 5) Culotte d'incontinence/couche			Fréquence et aspect des selles : N ___ / ___ / ___ J ___ / ___ / ___ S ___ / ___ / ___ N) Normales SL) Semi-liquides L) Liquides D) Dures M) Molle Sg) Sang*			
	Degré d'autonomie N ___ J ___ S ___ 1) Autonome 2) Aide partielle 3) Aide totale			Décompte de selles -VFS ☐			
	Sonde (type et #) : _____ Installée* ☐ En place ☐ Cessée* ☐			Péristaltisme ☐ / présence de gaz ☐			
	Quantité : N ___ / ___ J ___ / ___ S ___ / ___			Stomie _____			
	Cathétérisme* ☐ Bladder Scan* ☐			Aspect de la stomie : _____			
	1 ^{re} miction post _____			Abdomen souple ☐ distendu ☐			
	Irrigation vésicale*			Incontinence fecale (de novo) _____			
	Incontinence urinaire (de novo)						

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Soins et surveillances des drains

- MSI Vidanger ou remplacer le réservoir d'un système fermé de drainage de plaies
- MSI Retrait d'un système fermé de drainage de plaies (hémovac ou Jackson Pratt)

3 Tubes de drainage	TNG Mode : ____ Écoulement : ____				Autre tube/drain* : _____				
	Jackson Pratt: Écoulement : _____				Mode : _____				
	Drain thoracique : D ☐ G ☐ Mode : ____ Succion ☐ ____ cm H ₂ O Écoulement : ____ Oscille ☐ Bulle ☐					Autre tube/drain* : _____			
Mode : 1) Succion continue 2) Succion intermittente 3) Drainage libre 4) Clampé									
Écoulement : 1) Sanguin 2) Sérosanguin 3) Purulent 4) Verdâtre 5) Brunâtre 6) Jaunâtre									

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE

- Exemples : HV, HVAL, HAT+SOB, etc.

Dispositifs de soins : Pansement, sonde, BAE, bas séquentiels, mèche vaginale.

Particularités : saignement vaginal, diurèse

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE ORL

- Exemples : Trachéostomie, Thyroïdectomie, septoturbinoplastie

Dispositifs de soins : drain, pansement

Particularités :

- Thyroïdectomie totale ; signe de Trousseau, suivi taux calcémie
- Trachéo ; écarteurs, kit trachéo de rechange (canule interne et externe), aspiration au chevet fonctionnelle

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval

Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

- Exemples : PTH, PTG, reconstruction LCA, hallux valgus, ROFI, etc.

Dispositifs de soins : pansement (opsite visible, sec, dermabond), BAE, attelle plâtrée

Particularités : CCMS-PRO, MEC permis ou non, soins du plâtre, physiothérapie, coussin abducteur PRN.

Vous pouvez retrouver de la capsule de formation complémentaire orthopédie(ERAS):
<https://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/ressources-humaines/formation/>

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval

Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE UROLOGIQUE

Exemples : Cystectomie radicale avec conduit iléal, TVT, RTUP, PRRP, néphrectomie, etc.

Dispositifs de soins : sonde, irrigation vésicale en continu, stomie, BAE, bas séquentiels.

Particularités : Coloration urine selon échelle, surveillance spasmes vésicaux

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE UROLOGIQUE

PRRP par tomie ou par scopie

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE UROLOGIQUE

RTUP

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE UROLOGIQUE

Soins et surveillances
chirurgie urologique -
RTUP

LAVAGE VESICAL CONTINU

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE, à chaque instant

CHIRURGIE VASCULAIRE

Soins et surveillances chirurgie vasculaire – Membres inférieurs

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Québec DTG 8 0 0

ORDONNANCES ET SUIVI SYSTÉMATIQUE CHIRURGIE VASCULAIRE DES MEMBRES INFÉRIEURS TRAITEMENTS

PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE	Jour 0 (intervention)	Jour 1	Jour 2	Ad congé
Signes vitaux et signes neurovasculaires : → Avenir si pouls plus de 100 / min → Avenir si déficit neurovasculaire ou perte de signal doppler (si présent à la salle de réveil)	Q 15 min ad stabilité Q 1 heure x 4 h Q 4 heures x 24 h	TID	∞	∞
Dosage ingesta/écresa : ☐ Cathétérisme vésical PRN si résidu vésical ≥ 300mL post-mictionnel → Avenir si diurèse moins de 160 mL 8 heures ☐ Cesser sonde urinaire au jour # _____	Q 4 heures	Q 8 heures par la suite	∞	∞
☐ Spirométrie 5 min q 1 heure (respecter la sommeil)	✓	✓	✓	✓
☐ Physiothérapie en post-op jour # _____				
Mobilisation ☐ Repos au lit ad _____ ☐ Assoir au fauteuil jour # _____ ☐ Marche jour # _____				
Dîète ☐ Selon tolérance ☐ NPO ad visite médicale le _____ ☐ Autre : _____	✓	✓	✓	✓
LABORATOIRES ET TESTS ☐ FSC ☐ Urée ☐ Electrolytes ☐ Créat ☐ Salle de réveil ☐ Troponine ☐ CKTOX ☐ ECG ☐ Unité + Heure : _____ ☐ Autres : _____		✓	✓	
MISE EN CHARGE Pour usagers avec plaies et gangrène du pied ☐ Mise en charge permise en post-op sur le talon seulement ☐ Pas de mise en charge sur pied gauche ☐ Pas de mise en charge sur pied droit ☐ Mise en charge permise en post-op avec sandale ☐ Mise en charge permise en post-op avec botte de décharge				
RETRAIT DU PANSEMENT OPÉRATEUR → Le pansement opératoire sera enlevé par le médecin				
Types de pansements ☐ Sec die ☐ Bacigras die ☐ Humide Mèche ☐ Plain ☐ Iodoformée Aquacel ☐ Standard ☐ Ag ☐ Foam Biatin ☐ Standard ☐ Ag ☐ Autre : _____	Fréquence ☐ _____	Nettoyage ☐ NaCl ☐ Provoindine ☐ Chlorexidine ☐ Autre : _____		
CONGÉ ☐ Clinique de prévention secondaire (CPS) au CARL				
Date : _____ Heure : _____ Signature du médecin : _____ N° de permis : _____				

64-001-112 Date : 2017-03-20 Ordonnances et suivi systématique chirurgie vasculaire des membres inférieurs traitements 1 de 1
 Dossier médical

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Québec

DIGNE DE CONFIANCE, à chaque instant

CHIRURGIE BARIATRIQUE

➤ Exemples : Lap band, Sleeve, Bypass

Dispositifs de soins : plaies (laparoscopie), BAE au genoux, bas séquentiels genoux

Particularités : diète, éviter la paille, éviter de grandes quantités de liquide ingéré, gomme à mâcher non recommandée

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE PLASTIQUE

- Exemples : réduction mammaire, abdominoplastie, etc.

Dispositifs de soins : drains, gaine, pansement

Particularités : même à la mobilisation garder le ventre fléchi vers l'avant

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CHIRURGIE BUCCALE

- Exemples : Ostéotomie de Lefort

Dispositifs de soins : fils de métal pour retenir la mâchoire

Particularités : avoir des ciseaux au chevet en cas d'urgence (vomissements, risque élevé aspiration), alimentation liquide, application de glace, avoir la succion en marche au chevet.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

COMPLICATIONS EN PÉRIODE POSTOPÉRATOIRE

COMPLICATIONS SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL

Iléus paralytique, occlusion, constipation

Examen clinique de l'abdomen:

- Inspection (normalité : taille normale pour l'usager, symétrique, exempt de rougeur ou de coloration anormale)
- Auscultation (normalité : 5-35 bruits intestinaux/min)
- Palpation (normalité : abdomen souple)

Voir MSI examen de l'abdomen

Évaluer également :

- Présence de nausées/vomissements, reflux gastrique, hoquet
- Présence de ballonnements
- Fréquence et aspect des selles, présence de gaz
- Tolérance à l'alimentation

- MOBILISATION PRÉCOCE
 - RESPIREX
- ALIMENTATION ET HYDRATATION PROGRESSIVE ET SELON TOLÉRANCE
 - PRISE DE LAXATIFS PRN (SOUS ORDONNANCE INDIVIDUELLE)

	Observations / interventions			N	J	S	Observations / interventions			N	J	S
9. Élimination vésicale et intestinale (E)	Particularité de l'élimination*						Date de la dernière selle :					
	Mode d'élimination N ___ J ___ S ___ 1) Toilette 2) Chaise d'aisance 3) Bassine/Urinal 4) Culotte de protection 5) Culotte d'incontinence/couche						Fréquence et aspect des selles : N ___ J ___ S ___ N) Normales SL) Semi-liquides L) Liquides D) Dures M) Molle Sg) Sang*					
	Degré d'autonomie N ___ J ___ S ___ 1) Autonome 2) Aide partielle 3) Aide totale						Décompte de selles -VFS ☐					
	Sonde (type et #): Installée* ☐ En place ☐ Cessée* ☐						Péristaltisme ☐ / présence de gaz ☐					
	Quantité : N ___ J ___ S ___						Stomie					
	Cathétérisme* ☐ Bladder Scan* ☐						Aspect de la stomie :					
	1 ^{ère} miction post						Abdomen souple ☐ distendu ☐					
	Irrigation vésicale*						Incontinence fécale (de novo)*					
	Incontinence urinaire (de novo)*

COMPLICATIONS SYSTÈME URINAIRE

Rétention urinaire, hématurie, infection tractus urinaire

Examen clinique de l'abdomen (région sus-pubienne):

- Inspection (normalité : pas de masse visible à la ligne abdominale médiane)
- Palpation (normalité : pas de globe vésical palpable, pas de douleur ou inconfort à la palpation)
- *Bladder scan*

Voir MSI examen de l'abdomen

OC-026 Initier l'insertion d'un cathéter vésical dans le but de soulager la rétention urinaire

Évaluer également :

- Bilan ingestas/excretas
- Quantité de l'urine (normalité : 30ml/h minimal)
- Coloration de l'urine (échelle de coloration de l'urine)
- Vérifier si présence de dysurie
- Cystoflow si applicable (vitesse irrigation, coloration de l'urine, présence de caillots, aspect du drainage)

- HYDRATATION
- MOBILISATION
- ASEPSIE DU CIRCUIT SONDE VÉSICALE
- RETRAIT PRÉCOCE SONDE (SOUS ORDONNANCE INDIVIDUELLE)
- VÉRIFICATION PERMÉABILITÉ SYSTÈME DRAINAGE

	Observations / interventions			N	J	S	Observations / interventions			N	J	S
	9. Élimination vésicale et intestinale (E)						Observations / interventions					
Particularité de l'élimination*							Date de la dernière selle :					
Mode d'élimination N ___ J ___ S ___ 1) Toilette 2) Chaise d'aisance 3) Bassine/Urinal 4) Culotte de protection 5) Culotte d'incontinence/couche							Fréquence et aspect des selles : N ___ / ___ / ___ J ___ / ___ / ___ S ___ / ___ / ___					
Degré d'autonomie N ___ J ___ S ___ 1) Autonome 2) Aide partielle 3) Aide totale							N) Normales SL) Semi-liquides L) Liquides D) Dures M) Molle Sg) Sang*					
Sonde (type et #) : Installée* ☐ En place ☐ Cessée* ☐							Décompte de selles -VFS ☐					
Quantité : N ___ / ___ / ___ J ___ / ___ / ___ S ___ / ___ / ___							Péristaltisme ☐ / présence de gaz ☐					
Cathétérisme* ☐ Bladder Scan* ☐							Stomie					
1 ^{ère} miction post							Aspect de la stomie : _____					
Irrigation vésicale*							Abdomen souple ☐ distendu ☐					
Incontinence urinaire (de novo)*							Incontinence fécale (de novo)*

COMPLICATIONS SYSTÈME TÉGUMENTAIRE

Infection site opératoire ou du drain, hématome, déhiscence de l'incision, éviscération

Examen clinique du site opératoire :

- Inspection
 - Écoulement/exsudat
 - Présence de rougeur
 - État bords de plaies et de la peau environnante (absence d'hématome)
 - Présence sinus et/ou espaces sous-jacents
 - Dimensions de la plaie
 - Odeur
 - Apparence lit de la plaie
 - Présence agrafes ou points sutures)
- Palpation (normalité : absence induration ou de masse)
- CCMS-PRO lorsque requis (orthopédie, vasculaire)
- Intensité de la douleur

MSI Processus de cicatrisation d'une plaie
PI-045 Choix de méthode de réfection de pansement de plaies
Trousse soins des plaies

- GARDER LA PEAU PROPRE, CHANGER LE PANSEMENT EN PRÉSENCE ÉCOULEMENT
 - ÉVALUER SITE OPÉRATOIRE MINIMALEMENT Q 8H
- DOCUMENTER ÉVOLUTION DE LA PLAIE
- ÉVALUER SITE DRAIN ET APPARENCE LIQUIDE DRAINÉ Q 8H
 - TOUX ET MOBILISATION AVEC BB
- NUTRITION ET HYDRATATION EN FONCTION ÉTAT CLINIQUE DU PATIENT

7. Intégrité de la peau (I)	Peau et muqueuses intactes			Surface thérapeutique (Type : _____)		
	Particularité de la peau et téguments*	En place	Apparence du pansement			
Site de la plaie	Pansement	☐				
		☐				
		☐				
		☐				

Formulaire en soins des plaies - VFS

COMPLICATIONS SYSTÈME RESPIRATOIRE

Surcharge, atelectasie, pneumonie, OAP, embolie pulmonaire, dépression respiratoire

Examen clinique du système respiratoire :

- Inspection (normalité : symétrie de la cage thoracique)
- Auscultation (normalité : présence de murmures vésiculaires sans bruits surajoutés)
- Effort respiratoire (absence de dyspnée)
- Fréquence, rythme et amplitude respiratoire
- Type de respiration
- Présence de ronflements
- Saturation pulsée en oxygène
- Besoins en oxygène
- Présence de tirage, battement ailes du nez
- Toux, expectorations, aspect des sécrétions
- Cyanose et coloration de la peau (pâleur, grisâtre), retour capillaire

MSI Auscultation pulmonaire

Évaluer également :

- Bilan ingestas/excretas
- Niveau de sédation
- Signes vitaux complets
- Présence d'œdème aux membres inférieurs et œdème à godet

1. Fonction cardiorespiratoire	Observations / interventions	N	J	S	Observations / interventions	N	J	S
	Respiration sans particularité					Trachéo : _____		
Particularités / difficultés respiratoires * (Pédiatrie VFS ☐)					Soins de trachéo (nb de fois) N _____ J _____ S _____			
Exercices respiratoires : _____					Signes neurovasculaires : _____			
Aspiration des sécrétions (nb fois)* N _____ J _____ S _____					Télémetrie # _____			
C-PAP ☐ BI-PAP ☐					Bas antiembolique ☐ Compression inter. ☐			
Toilette nasale - Pédiatrie VFS								

- MOBILISATION
- RESPIREX
- HYDRATATION SELON ÉTAT CLINIQUE
- TECHNIQUE DE TOUX ET DE RESPIRATION PROFONDE (AVEC BÉBÉ)
- SURVEILLANCE DIURÈSE (BILAN I/E)

COMPLICATIONS SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE

Hémorragie, choc hypovolémique, hypotension, thrombose, phlébite (thrombophlébite profonde, embolie pulmonaire, AVC, infarctus), arythmies cardiaques (FA)

Examen clinique du système cardiovasculaire :

- Rythme et amplitude pouls
- Fréquence cardiaque
- Évaluation clinique respiratoire
- Cyanose et coloration de la peau (pâleur, grisâtre), retour capillaire
- CCSM-PRO membres inférieurs / supérieurs selon la situation clinique
- Présence de douleur (douleur rétro sternale DRS, palpitations)

OC-002 Initier l'administration de nitroglycérine sous-linguale lors de DRS

Évaluer également :

- État général (présence étourdissements, faiblesse, nausées et vomissements)
- Bilan ingesta / excreta
- Diurèse
- Niveau de sédation, état de conscience
- Signes vitaux complets

1. Fonction cardiorespiratoire	Observations / interventions	N	J	S	Observations / interventions	N	J	S
	Respiration sans particularité					Trachéo : _____		
Particularités / difficultés respiratoires * (Pédiatrie VFS ☐)					Soins de trachéo (nb de fois) N _____ J _____ S _____			
Exercices respiratoires : _____					Signes neurovasculaires : _____			
Aspiration des sécrétions (nb fois)* N _____ J _____ S _____					Télémetrie # _____			
C-PAP ☐ BI-PAP ☐					Bas antiembolique ☐ Compression inter. ☐			
Toilette nasale - Pédiatrie VFS								

- MOBILISATION
- BAE, BAS SÉQUENTIELS
- EXERCICES MI
- THROMBOPROPHYLAXIE
- HYDRATATION SELON ÉTAT CLINIQUE

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

AUTRES COMPLICATIONS

Désordres électrolytiques (Na, K, Mg)

- Causés par : Solutés, jeûne opératoire
- Suivi des résultats de laboratoire, aviser médecin PRN

Delirium

- Repérage du delirium avec RADAR lors administration médicaments. Si positif, effectuer le dépistage avec CAM

PID-013 Prévention, évaluation et suivi du delirium en milieu hospitalier

10. État cognitif, psychosocial et comportement (E) Si particulière ou changement	État de conscience : alerte ☐ anormal ☐					Attention				
	Orientation (temps / espace)					Organisation / opérations de la pensée				
	Apparence					Mémoire				
	Comportement					Perception				
	Humeur / affect					Jugement / autocritique / planification / conscience				
	Langage					RADAR ☐ (si positif) CAM * ☐				
	Perception / Adaptation / Vécu de l'utilisateur / Implication - soutien de la famille et des proches									

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ENSEIGNEMENT POSTOPÉRATOIRE

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ENSEIGNEMENT POSTOPÉRATOIRES

- Respirex au chevet
- Mobilisation précoce
- Gomme à mâcher si applicable
- Diète selon tolérance
- Co-analgésie
- Exercices actifs MI

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ENSEIGNEMENTS POSTOPÉRATOIRES Cheminement ERAS

	JOUR DE LA CHIRURGIE	1 JOUR APRÈS LA CHIRURGIE	2 JOURS APRÈS LA CHIRURGIE	3 JOURS APRÈS LA CHIRURGIE
Exercices de respiration	10 x / heure	10 x / heure	10 x / heure	10 x / heure
Activités	séance au fauteuil et exercices au lit	6h à 8h hors du lit	6h à 8h hors du lit	6h à 8h hors du lit et retour à la maison
Contrôle de la douleur	Pompe ACP maintenir douleur en bas de 4/10	Pompe ACP maintenir douleur en bas de 4/10	Pilules maintenir douleur en bas de 4/10	Pilules maintenir douleur en bas de 4/10
Nutrition	liquides protéinés, repas complet selon tolérance et gomme à mâcher	liquides protéinés, repas complet et gomme à mâcher	liquides protéinés, repas complet et gomme à mâcher	liquides protéinés, repas complet et gomme à mâcher
Tubes et lignes	Tubes et lignes	Tubes et lignes	Tubes et lignes	Tubes et lignes

Source : CISSS de Laval (2017) ERAS

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ENSEIGNEMENTS POSTOPÉRATOIRES

Exercices MI

Faites tourner vos pieds
vers la droite et vers la gauche.

Bougez les orteils et pliez
les pieds vers le haut et
vers le bas.

Tendez les jambes.

Source : CISSS de Laval (2018) ERAS

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ENSEIGNEMENTS POSTOPÉRATOIRES

Objectifs personnalisé - ERAS

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

ENSEIGNEMENTS POSTOPÉRATOIRES

Objectifs personnalisé - ERAS

Programme de récupération rapide en chirurgie ERAS^{MD}

Je participe à mes soins

1- Je m'assois au fauteuil : J'inscris la durée de temps assis au fauteuil en minutes.

L'objectif ERAS^{MD} = S'asseoir au fauteuil 3 fois par jour (minimum).

	AM	PM	SOIRÉE	EXTRA
Jour 0				
Jour 1				
Jour 2				
Jour 3				

2- Je marche au corridor : J'indique les moments quand je marche au corridor en indiquant un « X » ou « ✓ ».

L'objectif ERAS^{MD} = Marcher au corridor 2 fois par jour (minimum).

	AM	PM	Extra
Jour 0			
Jour 1			
Jour 2			
Jour 3			

3- Je bois mes suppléments alimentaires : J'indique la quantité bue du verre (exemple : 1/2, 3/4).

L'objectif ERAS^{MD} = Boire le supplément alimentaire 3 fois par jour selon votre tolérance.

	Déjeuner	Dîner	Souper
Jour 0			
Jour 1			
Jour 2			
Jour 3			

4- Je mange une diète normale : J'indique la quantité de nourriture mangée dans l'assiette principale (exemple : 1/2, 3/4).

L'objectif ERAS^{MD} = Manger le contenu de votre assiette selon votre tolérance.

	Déjeuner	Dîner	Souper
Jour 0			
Jour 1			
Jour 2			
Jour 3			

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CONGÉ POSTOPÉRATOIRE

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

CONGÉ POSTOPÉRATOIRE

Procédures

- Rôle de l'infirmière vs infirmière auxiliaire
- Congé signé VS congé prévu
- Aviser l'infirmière de liaison si l'utilisateur requiert des soins infirmiers ou compléter le formulaire PRSI (selon la chirurgie)
- Enseignements
- Remettre enveloppe de départ
- Prise des signes vitaux, dépistages

CONGÉ POSTOPÉRATOIRE

Enveloppe de départ

- Brochures (PRN)
- Feuille sommaire
- Prescriptions de départ
- Cartes : CISSS Laval, RAMQ, autres (vasculaire, prothèses, Picline, etc.)
- Rendez-vous suivi, clinique externe, chirurgien, autres (spécialité), etc.
- Papier incapacité travail
- Requêtes examens, laboratoires
- Dépliant "Ce que vous devez savoir si vous prenez un médicament opiacé pour la douleur – Conseils pour le retour à la maison"
- PRSI (uro, seins, gyneco)

DIGNE DE CONFIANCE,
à chaque instant

CONGÉ POSTOPÉATOIRE

Enveloppe de départ

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Québec

CLINIQUE DE CHIRURGIE
AIDE-MÉMOIRE POUR RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS DE SUIVI

Spécialité : _____ Dr(s) : _____
 Date: _____ Heure : _____ Début requis : _____ Par : _____
 2^e numéro de téléphone (autre que domicile) : _____ Bactérie multirésistante (BMR) : Oui

Renseignements cliniques :
 Diagnostic : _____
 Chirurgie : _____
 Particularités : _____ Porteur de sonde

Examens(s) préalable(s) : Radiographie PSA SCAN Échographie
 Autres : _____

Prélevement(s) préalable(s) : _____

	TÉLÉPHONE	TÉLÉCOPIE
CLINIQUE DE CHIRURGIE 1 au RC.49		
☐ CHIRURGIE BARIATRIQUE	450 975-5562	450 975-5067
☐ CHIRURGIE GÉNÉRALE		
☐ CHIRURGIE GÉNÉRALE ET STOMOTHÉRAPIE		
☐ STOMOTHÉRAPIE		
☐ NUTRITION BARIATRIQUE AU D.SS.90	459 668-1010 # 23622	450 975-5933
CLINIQUE DE CHIRURGIE 2 AU 1.30 :		
☐ CLINIQUE DE LA DOULEUR		
☐ CHIRURGIE PLASTIQUE	450 975-5330	450 975-5028
☐ CHIRURGIE PLASTIQUE ET STOMOTHÉRAPIE		
☐ CHIRURGIE VASCULAIRE		
☐ CLINIQUE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE AU D.1004	450 975-5563	450 975-5094
☐ CLINIQUE DE GYNÉCOLOGIE-ONCO (CICL) Bloc G	450 975-5359	450 975-5044
☐ CLINIQUE D'OPHTHALMOLOGIE AU 1.070	450 975-5344	450 975-5042
☐ CLINIQUE D'ORL AU 1.121	450 975-5570	450 975-5010
☐ CLINIQUE D'ORTHOPÉDIE AU RC.280	450 975-5569	450 975-5059
☐ CLINIQUE D'UROLOGIE AU RC.80	450 975-5913	450 975-5840
☐ CLINIQUE DU SEIN AU RC.135	450 975-5390	450 975-5967
☐ CLINIQUE D'ENDOSCOPIE AU RC.240	450 975-5400	450 975-5036

La clinique concernée vous contactera par téléphone pour vous donner votre rendez-vous

RENDEZ-VOUS À CONFIRMER :
 TÉLÉCOPIER DIRECTEMENT À LA CLINIQUE CONCERNÉE
 S'il y a détérioration de votre état général, contactez la clinique au numéro de téléphone indiqué ci-haut.

64-675-103
(Rev. 2019-09-19)

AIDE-MÉMOIRE POUR RENDEZ-VOUS - CLINIQUE MÉDECINE SPÉCIALISÉE - CLINIQUE CHIRURGIE

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Québec

CONGÉ POSTOPÉRATOIRE

Enseignements de départ

Signes de complication à surveiller:

- Fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ pendant plus de 24 h (non soulagée par Tylenol)
- Douleur importante au site non soulagée par Rx
- Reprises des saignements vaginaux (ou odeur nauséabonde)
- Bain vs douche vs piscine/spa
- Signes d'infection de la plaie
- Douleur au mollet
- Prise d'analgésie et la conduite automobile

CONGÉ POSTOPÉRATOIRE

Thromboprophylaxie

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

VÉRIFICATIONS À EFFECTUER POUR UN CONGÉ SÉCURITAIRE

Initialiser lorsque fait →

Respiratoire

Tous les consultants (médecins et intervenants) encore actifs au dossier sont informés du congé incluant le SAD.
Le lieu et l'adresse de retour sont validés avec l'utilisateur ou son proche. Préciser le lieu : _____
Le numéro de téléphone pour répondre l'utilisateur est validé. Préciser s'il diffère aux renseignements : _____
L'utilisateur (et son proche à sa demande) est informé de son congé et de l'heure du départ.
Pour tout usager dans l'impossibilité de quitter pour son congé de façon autonome ou lors d'un transfert, aviser la personne-ressource ou un proche à moins d'un refus de l'utilisateur. Nom de la personne : _____
 N/A Refus de l'utilisateur Proche ou personne-ressource avisée
Transport choisi et réservé pour le départ : Aucun Taxi Transport adapté Transport médical adapté Ambulance

Documentaire

Remettre et expliquer à l'utilisateur les documents qui s'appliquent

Feuille sommaire clinique (M51-034-476) N/A Télécopiée Document remis
Bilan comparatif des médicaments N/A Télécopiée Document remis
Ordonnances de départ N/A Télécopiée Document remis
Requêtes d'examen/interventions/consultations N/A Télécopiée Document remis
Demande de rendez-vous N/A Télécopiée Document remis
Avis d'administration de produit cancéreux N/A Document remis
Enveloppes de départ pour les milieux visités N/A Document remis
Profil d'autonomie fonctionnelle (pour les usagers avec transfert de prise en charge) N/A Télécopiée
Carte N/A FPMQ C.S.L. Autre : _____
Document relatif à un arrêt de travail N/A Document remis

Autre (spécifier) : _____

Dernières interventions

Cocher les éléments faits et pertinents pour l'utilisateur

Remettre la médication N/A
 Remettre le lait materné N/A
 Clinique anticoagulation avisée N/A
 Procéder à l'évaluation clinique de l'utilisateur N/A
 Retirer les accès veineux N/A
 Accès veineux intact N/A
 Dépistage des bactéries multirésistantes N/A
 Remettre les effets personnels de l'utilisateur N/A
 S'assurer que l'utilisateur quitte avec un habillement adapté et adapté à la température extérieure (ex. : sans jaquette d'hôpital, avec chaussures, avec un manteau ou une couverture) N/A

Transfert info

Cette section s'applique uniquement lors d'un transfert. Cocher les éléments faits et pertinents pour l'utilisateur. N/A

Avoir de l'heure d'attente
 Transmettre au prochain prestataire l'information requise pour assurer la continuité des soins et services
 S'assurer de la connaissance des prochains prestataires de soins pour des soins complexes requis (soins plaies complexes, soins infirmiers, etc.)
 S'assurer de la disponibilité du matériel requis pour les soins complexes à l'endroit où l'utilisateur sera transféré (ex. : VAC)

Nom et titre d'emploi _____ Initiales _____ Date _____

63-200-182
Date : 2022-09-23
DOSSIER MÉDICAL

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

VÉRIFICATIONS À EFFECTUER POUR UN CONGÉ SÉCURITAIRE

Enseignement

Cocher tous les éléments qui sont pertinents pour l'utilisateur pour lesquels vous avez fait de l'enseignement. Si d'autres enseignements ont été faits, veuillez le détailler dans votre note.

Enseignement systématique complété
 Instructions relatives à la médication (quand, comment et pourquoi prendre les médicaments) et aux traitements
 Modifications à apporter au mode de vie, préciser : _____
 Auto-soins à réaliser, préciser : _____
 Retenez-vous et examen(s) de suivi, préciser : _____
 Signes et symptômes de délérioration et comment intervenir le cas échéant
 Coordonnées de ressources utiles
 Dépliant d'information/feuillelet d'enseignement : _____
 Autre, préciser : _____

Note de départ

Veuillez documenter uniquement les éléments que vous n'avez pas déjà abordés dans ce document.

Date : _____ Heure du départ : _____
Quitte : Sur pieds En fauteuil roulant Gilet d'auto Autre : _____
 Vérification des bracelets d'identification de famille
Accompagné de : _____ N/A

Signature : _____

63-200-182
Date : 2022-09-23
DOSSIER MÉDICAL

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

DIGNE DE CONFIANCE, à chaque instant

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA VALENSANTÉ

Vous pouvez aller sur Laval en Santé afin d'avoir les consignes données aux usagers pour diverses chirurgies.

Vous y trouverez :

- Avant la chirurgie
- Se préparer à la chirurgie
- Après la chirurgie
- Consignes post-chirurgie
- Surveillance et complications
- Brochures d'enseignement pour les usagers

<https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/chirurgie/>

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

Questionnaire post formation

Veillez vous diriger à l'adresse suivante pour compléter le questionnaire post formation **obligatoire** :

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5ktJtvGg6lEdPlcJZw3AVwIVUNDdBUU1LWUQ1UUZaRldVUFNDUjJTR0IEViQIQCN0PWcu

Durée du questionnaire: **30 minutes**

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

RÉFÉRENCES

CISSS de Laval. (2018). ERAS. Passeport pour ma chirurgie gynécologique.

CISSS de Laval. (2017). ERAS. Objectifs pour ma chirurgie colorectale.

MSI. (2010). *Auscultation pulmonaire*. Repéré à <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/auscultation-pulmonaire>

MSI. (2013). *Examen de l'abdomen*. Repéré à <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/examen-de-labdomen>

MSI. (2013). *Pansement d'un cathéter épidural temporaire*. Repéré à <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/pansement-dun-catheter-epidural-temporaire>

MSI. (2015). Processus de cicatrisation d'une plaie. Repéré à <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/processus-de-cicatrisation-dune-plaie>

Ruel, M-C., Lapierre, A., Côté, J. & Arbour, C. (2019). Soins post-opératoires : programmes ERAS. *Perspective infirmière*, 16(1). 24-31

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec