

FICHE INDICATIVE

Concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque

| Septembre 2020 |

Cette fiche mentionne les indications de vaccination gratuite, soutenues financièrement par le MSSS, pour le vaccin contre la grippe à partir de l'âge de 6 mois, le vaccin contre le pneumocoque conjugué (Pneu-C) à partir de l'âge de 2 mois et le vaccin contre le pneumocoque polysaccharidique (Pneu-P) à partir de l'âge de 2 ans. Pour plus de détails, voir la section *Calendriers de vaccination, Autres vaccins recommandés* et la section *Vaccins, Pneumocoque, Tableau synthèse des vaccins contre le pneumocoque* dans le PIQ.

POPULATIONS / CONDITIONS		GRIPPE INDIQUÉ ET GRATUIT	PNEUMOCOQUE INDIQUÉ ET GRATUIT		
			PNEU-C < 18 ANS	PNEU-C ≥ 18 ANS	PNEU-P ≥ 2 ANS
CONDITIONS MÉDICALES OU CONDITIONS DE VIE	Femmes enceintes, en bonne santé au 2^e ou au 3^e trimestre de la grossesse (13 semaines et plus)	Oui	Non		
	Personnes âgées de 6 mois à 74 ans, incluant les femmes enceintes (quel que soit le stade de la grossesse) , présentant l'une des conditions énumérées ci-dessous :				
	Asplénie anatomique ou fonctionnelle	Oui	Oui	Oui	Oui
	Conditions amenant une immunodépression (ex. : déficit immunitaire, leucémie, traitement immunodépresseur, greffe d'organe ou de moelle osseuse, cancer, infection par le VIH)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Insuffisance rénale chronique ou syndrome néphrotique	Oui	Oui	Non	Oui
	Maladie cardiaque ou pulmonaire chronique assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers	Oui	Oui	Non	Oui
	Asthme assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, chez les personnes âgées de 50 ans et plus	Oui	Non	Non	Oui
	Asthme assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, chez les personnes âgées de moins de 50 ans	Oui	Non		
	Conditions entraînant une diminution de l'évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques d'aspiration (ex. : trouble cognitif, lésion médullaire, trouble convulsif, troubles neuromusculaires)	Oui	Oui	Non	Oui
	Diabète	Oui	Oui	Non	Oui
	Maladie hépatique chronique	Oui	Oui	Non	Oui
	Écoulement chronique de liquide céphalorachidien	Non	Oui	Non	Oui
	Itinérance et/ou utilisation actuelle et régulière de drogues dures (par inhalation ou injection) avec une détérioration de l'état de santé ou des conditions de vie précaires	Non	Oui	Non	Oui
	Présence d'un implant cochléaire	Non	Oui	Non	Oui
	Anémie (sauf si anémie falciforme ou autre hémoglobinopathie – voir asplénie)	Oui	Non		
	Hémophilie	Oui	Non		
Erreur innée du métabolisme (ex : tyrosinémie héréditaire de type I)	Oui	Non			
Obésité importante (IMC ≥ 40)	Oui	Non			
Traitement prolongé à l'acide acétylsalicylique (Pour les jeunes âgés de moins de 18 ans)	Oui	Non			
ÂGE OU MILIEU DE VIE	Résidents des centres d'hébergement, des établissements de soins de longue durée ou des ressources intermédiaires	Oui	-		
	Enfants âgés de 2 à 59 mois	Non	Oui	-	Non
	Personnes en bonne santé âgées de 65 à 74 ans	Non	-	Non	Oui
	Personnes âgées de 75 ans et plus	Oui	-	Non	Oui
CONTACTS	Travailleurs de la santé	Oui	Non		
	Personnes qui vivent sous le même toit et aidants naturels des personnes faisant partie des groupes à risque, incluant l'entourage des enfants âgés de moins de 6 mois	Oui	Non		

* Seulement si aucune dose n'a été reçue après l'âge de 65 ans.

SOURCE : Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).

msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination