

Adéno-amygdalectomie et myringotomie avec insertion de tubes

Anatomie

Les amygdales et les végétations adénoïdes sont situées dans le pharynx (gorge) dans la partie buccale et nasale respectivement. Les amygdales inflammées ou infectées chroniquement peuvent être source de douleur et obstruer les voies respiratoires. Les adénoïdes peuvent, quant à elles, obstruer les voies nasales, provoquer des ronflements ou peuvent bloquer les trompes d'Eustache et provoquer des otites ou infections aux oreilles. L'adéno-amygdalectomie est l'excision (le retrait) du tissu adénoïde et des amygdales.



Le tympan est une membrane transparente située dans l'oreille qui sert à faire passer le son de l'extérieur vers l'oreille interne. Le conduit auditif est relié au pharynx (gorge) par la trompe d'Eustache.

La myringotomie consiste à faire une petite incision dans le tympan et y insérer un petit tube afin de permettre le drainage de l'oreille. Le tube est invisible à l'œil nu et tombe par lui-même après 6 à 24 mois. L'incision et le tube soulage la douleur causée par la pression de l'accumulation de liquide ou sécrétions dans l'oreille moyenne et aide au drainage pour prévenir une future accumulation. L'incision guérit rapidement et n'entraîne pas de problème d'audition ni de surdit .

Consignes post-op ratoires

Il est normal de pr senter des vomissements brun tres apr s une ad no-amygdalectomie. Ils proviennent du sang aval  pendant la chirurgie, ils ne devraient pas persister plus de 6h apr s l'intervention.

L'insertion du tube n cessite de placer une ouate dans l'oreille. Si elle n'est pas tomb e, vous pouvez la retirer le lendemain. Vous pouvez en remettre une autre et la changer au besoin toutes les 4 heures s'il y a toujours un l ger  coulement au niveau de l'oreille. Cet  coulement est normal pour les 24h   72h apr s la chirurgie. Il peut  tre rouge-brun ou jaun tre.



Source : Rh ne-Poulenc Rorer, St-Lauren

Douleur


- Pour aider   diminuer la douleur   la gorge, il est possible d'appliquer de la glace au niveau du cou. Attention de mettre le sac de glace   l'int rieur d'une serviette pendant 15-20 minutes maximum   la fois,   r p ter toutes les 2 heures. Ne pas appliquer directement sur la peau.
- De la m dication peut  tre administr e en sirop ou en suppositoire au besoin (ex : ac tamino ph ne) selon les recommandations de votre chirurgien.

Hygi ne

Il est important de ne pas moucher fort le nez pour une dur e de 3 jours apr s la chirurgie. S'il y a  coulement, il est pr f rable d'essuyer le nez sans souffler.

Il est important de maintenir une bonne hygi ne de la bouche. La mauvaise haleine peut persister 7-10 jours. Il est normal que de petites taches blanches apparaissent de chaque c t  de la gorge, c'est un processus normal de gu rison, elles disparaissent toutes seules.

- Brosser les dents doucement avec la p te   dent habituelle.
- Selon l' ge de l'enfant, gargariser doucement la bouche avec de l'eau sal e (les enfants ne doivent pas utiliser de rince-bouche commercial).



Effort physique

- L'enfant doit éviter les efforts physiques importants environ 2 semaines après la chirurgie, à moins d'avis contraire du chirurgien. Il faut donc éviter les sports, l'éducation physique ou toute autre activité intense.
- La baignade est interdite pendant 1 semaine après la chirurgie. Par la suite, la baignade en piscine ou en mer est permise. Elle est cependant contre-indiquée dans les lacs car l'eau peut contenir des bactéries.
- Si votre enfant pratique le plongeon et qu'il a toujours la tête immergée sous l'eau, il est indiqué de porter un bonnet de bain avec une ouate enduite de gelée de pétrole (vaseline) ou des bouchons dans l'oreille. Votre chirurgien pourra vous donner des recommandations.
- Habituellement, une absence de l'école ou de la garderie est recommandée pour 1 à 2 semaines.



Alimentation et hydratation

- L'alimentation reprendra au retour à la maison seulement.
- Il est important de maintenir une bonne hydratation, même en cas de nausée. Il faut boire de l'eau en plus petites quantités mais plus souvent.
- Il faut éviter de consommer des produits laitiers pour le premier 24h suivant l'intervention (ils peuvent augmenter les risques de nausées et vomissements).
- Le retour à l'alimentation normale prend environ 1 semaine pour l'amygdalectomie.
- Quelques trucs pour vous aider :
 - o Offrir fréquemment des petites gorgées de Pedialyte^{MD} ou des friandises glacées de Pedialyte^{MD}.
 - o Offrir fréquemment des petites gorgées d'eau ou de jus frais sans acide (ex : pomme, pêche).
 - o Offrir fréquemment des friandises glacées de type Popsicle^{MD} ou MrFreeze^{MD}.
 - o Permettre à votre enfant de manger, de façon progressive et selon sa tolérance.
 - o Préparez des aliments mous, froids et faciles à avaler, comme le Jell-O^{MD}, sorbet, yogourt, purée de fruits, crème glacée, lait frappé ou smoothies. Utilisez un mélangeur au besoin et ajustez graduellement les textures.
 - o Évitez les aliments trop chaud ou irritants (trop épicés).

Complication

- Si votre enfant présente de la fièvre (38,5°C ou 101°F) pendant plus de 48h après la chirurgie.
- Douleur qui augmente au lieu de diminuer ou qui persiste plus de 10 jours.
- Saignement important du nez, des oreilles ou de la bouche ou vomissement de sang rouge clair. Chez le jeune enfant, il faut surveiller les déglutitions sans raison apparente (qui pourraient être un signe de saignement). Il est recommandé de pencher la tête de l'enfant vers l'avant ou le coucher sur le ventre afin de vérifier s'il y a un écoulement de sang vers l'extérieur de la bouche ou du nez.
- Si les vomissements de sécrétions brunâtres persistent plus de 6h immédiatement après la chirurgie.

VOTRE ENFANT NÉCESSITE ALORS UNE CONSULTATION MÉDICALE IMMÉDIATE.

VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC URGENCE SANTÉ AU 911.

Pour toutes autres questions, communiquer à l'une des ressources suivantes :

Info Santé (en tout temps) : 811

Clinique externe ORL de la Cité de la Santé : 450-975-5570

Clinique ORL Le Carrefour (bureau privé) : 450-687-1750